

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"א – 1986 התרופה משוקקת ללא מרשם רופא

גליצרין פתילות לילדים, 1.33 גרם

החומר הפעיל וכמותו:

כל פתילה מכילה:

1.33 גרם גליצרין (g 1.33 Glycerin)

גליצרין פתילות, 2.35 גרם

החומר הפעיל וכמותו:

כל פתילה מכילה:

2.35 גרם גליצרין (g 2.35 Glycerin)

גליצרין פורטה פתילות, 3.2 גרם

החומר הפעיל וכמותו:

כל פתילה מכילה:

3.2 גרם גליצרין (g 3.2 Glycerin)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

גליצרין פתילות וגליצרין פורטה פתילות - מתחת לגיל 6 שנים.
גליצרין פתילות לילדים - אין להשתמש בילדים מתחת לגיל שנתיים ללא הוראה של רופא.

עלך להשתמש בתרופה בצורה הנכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.
עלך לפנות לרופא באם סימני המחלה (הרוסמונים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

- 1. למה מיועדת התרופה?**
- התרופה מיועדת להקלת עצירות.

קבוצה תרפיטית:

משלשל

2. לפני שימוש בתרופה

⚠ אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (גליצרין) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים.

- אם לא הופיעה פעילות מעיים במשך יום אחד או יומיים בלבד (ראה גם בסעיף "אזהרות").
- במקרה של אי ספיקת לב.
- במקרה של דימום רקטלי בלתי מוסבר ובמקרה של חסימת מעיים או חוסר תפקוד כרוני של המעים.
- במקרים של בחילות, הקאות, כאבי בטן.
- במקרים של סימנים של דלקת התוספתן.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- זהירותו שימוש ממושך עלול לגרום לתלות בתכשירים משלשלים כגון זה.

- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא.

- הכשיר זה מיועד רק לעצירת הנמשכת מספר ימים. חוסר פעילות המעיים ליום אחד או יותר אינו מצדיק את השימוש בו. כמו כן, אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון "ציקוי הגוף" וכדומה.

- אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלך להודיע על כך לרופא לפני נסילת התרופה.

⚠לפני הטיפול בגליצרין ספר לרופא אם:

- את בהריון או מיניקה
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקודי: הלב ו/או כלי דם, מערכת העיכול
- הבחנת בשינוי פתאומי בתדירות פעילות המעיים אשר מתמשך מעל לשבועיים

⚠אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח: תרופות משלשלות אחרות.

⚠הריון והנקה:

אם את בהריון או מיניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

גליצרין וגליצרין פורטה פתילות: פתילה אחת

ביום לפי הצורך.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6 שנים.

גליצרין פתילות לילדים: פתילה אחת ליום לילדים לפי הצורך.

אין להשתמש בילדים מתחת לגיל שנתיים ללא הוראה של רופא.

אין לעבור על המנה המומלצת.

בשימוש ברציפות מעל שבוע יש להיוועץ ברופא.

- אין לבלוע, תרופה זו מיועדת לשימוש בפי הטבעת בלבד.

הוראות שימוש:

כיצד להחזיר את הפתילה:

- ראשית, שטוף היטב את ידך.
- הסר את העטיפה של הפתילה. ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחזרה.
- שכב על הצד. דחוף את הפתילה עמוק ככל שתוכל אל תוך הרקטום, בעזרת האצבע. אם הפתילה רכה מכדי לאפשר את החזרה, קדר אותה במקרר למשך 30 דקות או הוסי עליה מים קרים לפני הוצאתה מהטפוח.
- שטוף את ידך לאחר החזרת הפתילה. התכשיר פועל בדרך כלל תוך 15-60 דקות.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריות התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

- כיצד תוכל לסייע בהצלחת הטיפול? רצוי שהפתילה תישאר בפי הטבעת כ- 15 דקות.

הטיפול צריך להיות מלווה בצריכה מתאימה של נוזלים (1-1.5 ליטרים), הרגלי תזונה נדיאטה עשירת סיבים) ופעילות גופנית מתאימים.

- אין לטול תרופות בחושך ברוק התווית והמנה **בלב פשט** שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגליצרין עלול לגרום בחלק מהשתמשים לתופעות לוואי כגון פריחה בעור עם גירויים, בחילה, סחרחורת, כאבי בטן. אל תבער למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם:

- אתה סובל מגירוי מקומי, מפריחה מקומית או דלקת.

הופעת דימום רקטלי או העדר פעילות מעיים אחרי שימוש בתכשיר.

- הופיעה תגובה אלרגית שמתבטאת בגרד, נפיחות בפנים, בידים, בפה או בגרון, לחץ בחזה, קשיי נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עלך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית

של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המכנה לטופס המיון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י בסיס ליקשור:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלתו תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וראיתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה, תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- יש לאחסן בטמפרטורה של עד 25°C (מפץ' חדר).

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Stearic acid, sodium carbonate, water

כל פתילת גליצרין פתילות מכילה 19.8 מ"ג נתרן, כל פתילת גליצרין פורטה פתילות מכילה 26.9 מ"ג נתרן, כל פתילת גליצרין פתילות לילדים מכילה 11.2 מ"ג נתרן

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

גליצרין פתילות לילדים: פתילה אובלית שקופה

הפתילות מגיעות במגשיות אלומיניום באריזות של 5 או 500 פתילות.

גליצרין פתילות: פתילה אובלית שקופה

הפתילות מגיעות במגשיות אלומיניום באריזות של 20, 40, 100 או 500 פתילות.

גליצרין פורטה פתילות: פתילה אובלית שקופה

הפתילות מגיעות במגשיות אלומיניום באריזות של 10, 20, 100 או 500 פתילות.

היצרן ובעל הרישום וכותובת:

סם-ובל בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים

מספר רישום התרופה בפקנס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

גליצרין פתילות לילדים: 33 81 26843

גליצרין פתילות: 31 38 26506

גליצרין פורטה פתילות: 142 84 32039

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בפברואר 2016.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.