

מיקרופירין®

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
קרא/י בעיון את העלון עד סופו לפני השימוש בתרופה.

הרכב:

כל קפליה של מיקרופירין 75 בציפוי אנטרי מכילה: E.C. Acetylsalicylic acid 75 mg
כל טבליה של מיקרופירין 100 בציפוי אנטרי מכילה: E.C. Acetylsalicylic acid 100 mg

תכשירים אלו גם מכילים: Lactose, Microcrystalline Cellulose, Methacrylic Acid Polymer, Corn Starch, Talc, Stearic Acid, Triethyl Citrate, Colloidal Anhydrous Silica.

פעילות רפואית: מיקרופירין מעכב הצממת טסיות דם.

התוויה: התרופה מיועדת לטיפול במניעה ראשונית של מחלת לב כלילית בחולים בסיכון גבוה (של 5% ל-5 שנים) ולמניעה שניונית של מחלות הלב והמוח הנגרמות מפקקת עורקים.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות מאותה משפחה.
אין להשתמש בחולים הסובלים מכיב קיבה, מבעיות בקרישת הדם או מתסמונת של אסטמה, נזלת ופוליפים באף.
אין להשתמש במיקרופירין בילדים או מתבגרים עד גיל 20 הסובלים או מחלימים ממחלות כגון שפעת, אבעבועות רוח (מתוך חשש לתסמונת ריי).

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון (לא מומלץ ליטול אספירין במינון גבוה בשליש האחרון של ההריון) או מניקה, אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הלב ו/או כלי דם, יתר לחץ דם, הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול, מערכת הדם או מפוליפים באף.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

רצוי להמעיט בצריכת אלכוהול בתקופת הטיפול במיקרופירין.

אזהרות: אין להשתמש במיקרופירין בילדים ובמתבגרים ללא התייעצות עם רופא. אין ליטול תרופה זו לפחות 5 ימים לפני ניתוח כלשהו (כולל ניתוח דנטלי) אלא אם קיימת הוראה אחרת מהרופא. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה העולה על 10 ימים ברציפות בלי להיוועץ ברופא. בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו או בטיפול במינונים גבוהים יש לערוך בדיקות דם, תפקוד כבד וכליה. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אם הינך צורך/ת 3 או יותר משקאות אלכוהוליים ביום, יש להיוועץ ברופא אם ליטול תכשיר זה או להשתמש בתכשיר אחר לשיכוך כאבים או להורדת חום, שכן תכשיר זה עלול לגרום לדימומים בקיבה.

תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם סיימת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נוספות בעלות פעילות משככת כאבים; תרופות נגד בחילה; תרופות לטיפול בכיב קיבה (כגון סותר חומצה וחוסמי קולטנים להסטמין); תרופות המשנות את חומציות השתן (כגון מינון גבוה של סותר חומצה); תרופות נגד קרישת דם; תרופות נגד סכרת; תרופות לטיפול בשיגדון (פרובנציד, סולפיניפירזון, פנילבוטזון); סטרואידים; חומצה אסקורבית (ויטמין c); אצטזולמיד (לטיפול בגלאוקומה לדוגמה); חומצה ולפרואית

ופניטואין (לטיפול באפילפסיה); זידודין (לטיפול במחלת הכשל החיסוני); מטורקסט;
אנטיביוטיקות; פליקמיצין; חוסמי בטא, מעכבי האנזים המהפך (ACEI) ומשתנים
(לטיפול במחלות לב ולחץ-דם לדוגמה).

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות
לוואי כגון: בחילות והקאות, כאבי בטן קלים, צרבת. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר
לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר, אך אם הן מתמשכות או מטרידות היוועץ/י ברופא.
תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

סחרחורת, חולשה, פריחה בעור או גירויים, שינוי בשמיעה (במינון יתר), קשיים בנשימה, נפיחות
באיזור הפנים, צואה דמית או שחורה וכאבי בטן חזקים (נדיר): יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא ציינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך
הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

המינון: המינון המומלץ למבוגרים בהעדר הוראה אחרת מהרופא הינו: טבליה/קפליה אחת ליום.
תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים ומתבגרים עד גיל 20.
תרופה זו למניעת הצממת טסיות דם ניטלת על-פי הוראת רופא. אין לעבור על המנה המומלצת.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אופן השימוש: יש ליטול מיקרופירין פעם ביום, בשלמות, עם כוס מלאה מים.
אין לשכב 15-30 דקות לאחר נטילת מיקרופירין.
אין לחצות, אין לשבור או ללעוס את הטבליה/קפליה.
יש להמתין שעתיים בין נטילת המיקרופירין לבין נטילת תרופה סותרת חומצה נגד צרבת.
אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה.

מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים
ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,
יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים, ולהביא אריזת התרופה איתך.
אין ליגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י
משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום קריר ויבש (לא במקרר).
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב
לתאריך התפוגה של התכשיר!
בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: מיקרופירין 75: 674327307.
מיקרופירין 100: 1039328861.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו

דקסל בע"מ מקבוצת דקסון.
אור-עקיבא, ת.ד. 50, חדרה 38100, ישראל.