

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

קראו בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשו בתרופה  
פורמט זהו ע"ן נקבע ע"י משרד הבריאות  
ותוכנו נבדק ואושר באפריל 2011

# טיפטיפות סימיקול®

## טיפות

### הרכב:

Simethicone 40 mg/0.6 ml

כמות הנתרן בכל 1 מ"ל: 0.875 מ"ג

### מכיל גום:

Polysorbate 80, Sorbitan Monostearate 60, Microcrystalline Cellulose, Strawberry Flavour, Citric Acid (anhydrous), Sodium Benzoate, Sodium Citrate, Xanthan Gum, Saccharin Sodium, Purified Water.

**קבוצה תרופתית:** תרופה להקלה בגזים במערכת העיכול.

**פעילות רפואית:** תכשיר נגד גזים.

### התוויות:

התרופה מיועדת להקלה על כאבי בטן אצל תינוקות וילדים קטנים הנגרמים כתוצאה מהצטברות גזים.

### מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

### אזהרות:

אם הילד/ה רגישה/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

### תגובות בין-תרופתיות:

אם הילד/ה נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמר/ה זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

### תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי.  
בכל מקרה שבו הילד/ה מרגישה/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשה הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

## תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

יש להוריש לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי שהתפתחה לאחר מתן התכשיר וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

### מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

0.3 מ"ל (20 מ"ג) לפני כל ארוחה. ניתן להעלות המינון ל- 0.6 מ"ל (40 מ"ג) במידת הצורך.  
אין לעבור על 12 מנות של 0.3 מ"ל או 6 מנות של 0.6 מ"ל (סה"כ 240 מ"ג) ליום.  
בתקופת הטיפול בתרופה רצוי להיוועץ ברופא לצורך אבחון הגורם להצטברות הגזים.

### אופן השימוש:

יש ללמלא את המזרק המצורף עד למידה הרצויה ולטפסוף לפה. לאחר השימוש יש להפריד את חלקי המזרק, לטפסוף במים פושרים וסבון ולייבש.

### מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה.

אם נטל/ה הילד/ה מנת יתר או אם בטעות בלע/ה ילד/ה מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבאי/י ארזית התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!  
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה.

יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

**אחסנה:** מתחת ל- 25°C.

לשימוש עד חודש ימים מיום הפתיחה.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופא שסיפק לך את התרופה.  
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' רישום התרופה:** 533826579

### יצרן:

**כצט תעשיות כימיות בע"מ**, קרית-מלאכי.

**משוק: כצט בע"מ**, רח' החרש 4, הוד השרון.



10/2012

