

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986**  
**התרופה משווקת ללא מרשם רופא.**

**טיפטיפות מוקוליט, 75 מ"ג/מ"ל, טיפות לבליעה**

**הרכב:** החומר הפעיל כמותו וריכוזו:

**קרבוסיסטאין 75 mg/ml Carbocysteine**

כל טיפה מכילה 5 מ"ג קרבוסיסטאין.

למידע לגבי חומרים בלתי פעילים ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים, מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר שבעה ימים. טיפטיפות מוקוליט מיועד במיוחד לילדים.

**1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת להקלה בהפרעות במערכת הנשימה המלוות בליחה מוגברת ו/או צמיגה.  
**קבוצה תרופוטית: מכיחים**

**2. לפני שימוש בתרופה:**

**אין להשתמש בתרופה :**

- אם ידועה רגישות לחומר הפעיל, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. הסימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, קושי בבליעה או בנשימה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.
- בילדים מתחת לגיל שנתיים
- במקרה של כיב קיבה פעיל.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- **אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:** אם הכיח דמי או אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסטמה), מערכת העיכול ( כגון אולקוס).
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- אם הנך רגיש למזון או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

**אם אתה לוקח , או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**הריון והנקה:**

טיפטיפות מוקוליט מיועד במיוחד לילדים. אם הינך מבוגרת המשתמשת בתרופה, יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בתרופה אם:

- את בהריון, עשויה להיות בהריון או מתכננת להיכנס להריון, כיוון שאין להשתמש בתרופה בשלושת החודשים הראשונים של ההריון.
- את מניקה או מתכננת להניק.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:**

כל 1 מ"ל טיפטיפות מוקוליט מכיל כ-15 מ"ג נתרן.

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לפרבנים. הסימנים כוללים: פריחה, קושי בבליעה או בנשימה, נפיחות של השפתיים, הפנים, הגרון או הלשון.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.  
המינון המקובל בדרך כלל הוא:

גיל המטופל	מנה בטיפות	מספר מנות מקסימלי ביממה
2-5 שנים	12-25 טיפות	4 פעמים ביום
5-12 שנים	50 טיפות	3 פעמים ביום

#### מינון מקובל לילדים ע"פ משקל:

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי. לכן ניתן במקרים מעין אלה לקבוע את המינון לפי המשקל ע"פ התחשיב שלהלן.  
0.3-0.4 מ"ל (20 – 25 מ"ג) לק"ג משקל ליום.  
יש לחלק את המנה הכוללת לשלושה עד ארבעה מתנים ביום, בהתאם לגיל כפי שמפורט בטבלת המינונים.

#### אין לעבור על המנה המומלצת

**שים לב:** יש להקפיד על מדידת המנה בטפטפת.

#### אופן השימוש:

1. אין לנער את התרופה לפני השימוש, הניעור מקשה על יציאת הטיפות דרך הטפטפת.
2. אין להחליף את הטפטפת המקורית באחרת מאחר והיא מכילת להוצאת כמות מדודה ומדויקת בכל שימוש.
3. פתח את הפקק על ידי לחיצה למטה וסיבוב נגד כיוון השעון בו זמנית (ראה איור 1).
4. החזק את הבקבוק בצורה אנכית מעל הכפית וחכה לטפטוף (ראה איור 2).
5. אם לא יוצאות הטיפות, יש לטפוח בעדינות על תחתית הבקבוק (ראה איור 3)
6. ספור את הטיפות במדויק.
7. שפוך את תכולת הכפית המדודה לפה התינוק.
8. **אין לטפטף את התרופה ישירות מהבקבוק לפה התינוק !**  
נגב את ראש הבקבוק (הטפטפת) הקפד לסגור היטב את הפקק מיד בתום השימוש על מנת למנוע סתימת הטפטפת.

אם לא חל שיפור במצב תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.  
אולם במידה וחלה החמרה במצב החולה או מתפתח חום במהלך הטיפול יש לפנות לרופא לפני תום 7 ימי טיפול.  
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר יופיעו סימנים של קלקול קיבה (הפרעות במערכת העיכול).  
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.  
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.  
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.  
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בטיפות מוקוליט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם:

- מופיעים סימני אלרגיה הכוללים: פריחה, קשיי בליעה/ בעיות נשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.
- הופעת שלפוחיות על העור או דימום בעור מסביב לשפתיים, העיניים, הפה, האף או איברי המין.
- הופעת תסמונת "Stevens-Johnson syndrome" שסימניה דומים לשפעת וחום (שכיחות התופעה לא ידועה).

#### יש לדווח לרופא במקרים הבאים:

הקאות דמיות, צואה שחורה

תופעות לוואי נוספות:

- שלשול
- נזלת
- כאב ראש
- בחילה
- הקאות

### **דיווח על תופעות לוואי :**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור :  
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להיוועץ ברופא.

### **5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.  
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.  
אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25 °C.  
אחסן באריזה המקורית.  
לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש בטיפטיפות מוקולית במשך חודשיים, אולם בכל מקרה אין להשתמש לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

### **6. מידע נוסף:**

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Sorbitol Solution 70%, Sodium Carbonate Decahydrate, Sodium Citrate, Sodium Methyl Hydroxybenzoate, Citric Acid, Cream essence, Saccharin Sodium, Disodium Edetate, Sodium Propyl Hydroxybenzoate, Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: בקבוק זכוכית המכיל 15 מ"ל נוזל בצבע צהוב-חום בטעם קרמל. היצרן/ בעל הרישום וכתובתו : כצט תעשיות כימיות בע"מ, רח' הקדמה 3, קרית מלאכי.  
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 06/2016  
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1225430239  
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.