

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא / בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

אקמולי® לתינוקות

פתילות לתינוקות

הרכב

כל פתילה מכילה:
Paracetamol 80 mg

מרכיבים בלתי פעילים:
Witepsol W-35 , Witepsol E-76

קבוצה תרופתית

אנלגטי, אנטיפירטי.

פעילות רפואית

משכך כאבים ומוריד חום.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לפראצטמול או לאחד ממרכיביה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

אם התינוק/הילד/ה סובלת/ת או סבלה/ה בעבר מליקוי בתיפקוד הכבד, הכליה/מערכת השתן מאלכוהוליזם או מצהבת וירלית.

אזהרות

פרצטאמול עלול לגרום לנזק בכבד כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ, או לתקופה ממושכת, או כאשר בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים, או נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד. אין לתת תרופה זו במשך יותר מ-3 ימים רצופים ו/או לעיתים קרובות מבלי להיוועץ ברופא. אם הילד/ה רגישה/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום. אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח-למניעת מינון יתר/הרעלה של פרצטאמול.

תגובות בין-תרופתיות

אם הילד/ה נוטלת/ת תרופה נוספת או אם גמר/ה זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם רופא או תוספי תזונה, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד קרישת דם, תרופות נוספות בעלות פעילות משככת כאבים וכן תכשירים נוגדי דלקת (בשימוש ממושך) מטוכולפראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה, ובעיות קיבה אחרות), כולסטרמין (להפחתת יתר שומני הדם), או תכשירים המזרזים פעילות אנזימי הכבד כגון ברביטורטים, פניטואין (לעוויתות) או קרבמזפין, אנטיביוטיקה מסוג ריפמפיצין וכולורמפניקול או פרובנצייד (לטיפול בשגדון). אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: אדמומית או כאב באזור פי הטבעת.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

סימנים של אלרגיה (פריחה או גירוד בעור), נטייה לחבורות או דלקות ביתר קלות, בעיות בכבד (נדיר): הפסקו/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!

תופעות הנובעות ממינון יתר

שילשול, בחילה, הקאה, אובדן תיאבון, כאבי בטן, נפיחות, כאב או רגישות בבטן עליונה (נדיר): יש להפסיק נטילת התרופה ולפנות לרופא מיד!

בכל מקרה שהילד/ה מרגישה/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתו הכללית, על ההורה להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה. ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון

בהעדר הוראה אחרת מהרופא, המינון המומלץ הוא: גילאי 3-11 חודשים: פתילה אחת כל 6 שעות, עד 4 פתילות ב24 שעות. יש להמתין לפחות 4 שעות בין נטילת כל מנה. אין לעבור על המינון המומלץ. אם החום נמשך למעלה מ-3 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 5 ימים יש לפנות לרופא. אם ניתנה לילד בטעות מנה כפולה, יש להתייעץ מיידית עם הברופא או לפנות לחדר מיון.

הוראות השימוש

לשימוש חיצוני בלבד. רחץ/י היטב את ידיך. הפרד/י פתילה אחת מסרט הפתילות. להסרת העטיפה- הפרד/י הלשוניות בחלק השטוח של העטיפה. השכב/י את התינוק/הילד על צידו והחדר/י הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע. רחץ/י היטב את ידיך. הערה! אם הפתילה רכה מדי, ניתן לצננה במקרר במשך כ-30 דקות או לצננה תחת זרם מים קרים לפני הסרת העטיפה.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות ילד בלע מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא/י אריזה התרופה איתך. אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התוויות והמנה בכל פעם שהינך נותן/ת לילד תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו מתחת ל25°C. גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס.רישום התרופה: 132 91 31113 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
ת"ד 3190, פתח-תקוה.