



רני בטעם מנטה טבליות לעיסה

חומרים פעילים:

קלציום קרבונט 680 מ"ג (272 מ"ג סידן זמין) 680 mg Calcium carbonate
מגנזיום קרבונט 80 מ"ג 80 mg Magnesium carbonate (heavy)

חומרים בלתי פעילים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. יש להשתמש בתרופה זו בצורה נכונה. התייעץ עם הרוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. יש לפנות לרופא אם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 יום.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה במצבים של חומציות יתר בקיבה וצרבת. כל טבליה סותרת כ-16 mEq של חומצה.

קבוצה חומצית: סוחר חומצה

2. לפני השימוש בתרופה

✗ אין להשתמש בתרופה אם

- הנך רגיש לקלציום קרבונט או למגנזיום קרבונט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת כל החומרים, ראה פרק 6).
- הנך סובל ממחלת כליות חמורה.
- הנך סובל מרמות סידן גבוהות בשתן או מאבנים בכליות.
- הנך סובל מרמות סידן גבוהות או רמות פוספט נמוכות בדם.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אם להשתמש בתרופה זו במשך יותר משבועיים אלא בעצת רופאך. אם התסמינים אשר מכילה התרופה (לרשימת כל החומרים, ראה פרק 6) זאת על מנת לשלול מצבים רפואיים חמורים יותר.
- תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

לפני התחלת הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:

- הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה/מערכת השתן. יתכן והרופא יפנה אותך לביצוע בדיקות דם.
- הנך סובל מסרקואידוזיס (מחלה דלקתית הפוגעת באיברים שונים בגוף) או שהנך סובל מבעיות/מחלות כרוניות במערכת העיכול.
- הנך רגיש למזון כלשהו, או לתרופה כלשהי.

ללא אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תכשירים המכילים ברזל או פוספט.
- תרופות אנטיביוטיות ממשפחת הטטראציקלינים או הקינולונים.
- דיגוקסין ודיגיטוקסין (משמשים לטיפול בפרפרות ואי ספיקת לב).
- תרופות ממשפחת התיאזידים (תרופות משנתות).
- פלואורידים.
- לבוטירוקסין (הורמון בלוטת התירים).
- אלטרומופאג' (תרופה המשמשת להעלאת מספר הטסיות בדם). מומלץ להמתין לפחות 4 שעות לפני או אחרי נטילת אלטרומופאג' לנטילת רני.

שימוש בתרופה ומזון

בתקופת השימוש בתרופה, יש להימנע מצריכת כמויות גדולות של חלב או מוצרי חלב.

הריון ונקבה

ניתן לשימוש בנשים הרות או נמקות. אין לעבור על המינון המומלץ. יש להימנע משימוש ממושך ומצריכה עודפת של חלב ומוצרי חלב. היות והתרופה מכילה כמויות משמעותיות של סידן, לפני השימוש יש להיוועץ ברופא או ברוקח.

נדיה ושימוש במכונית

התרופה לא צפויה להשפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה מנטה סוכרזו. אם נאמר לך על ידי רופא כי הנך סובל מרגישות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת רני.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 2-1 טבליות למציצה או ללעיסה, לפי הצורך, עדיף כשעה לאחר האוכל ולפני השינה.
- לטיפול בצרבת ניתן ליטול 2-1 טבליות נוספות בין הזמנים הללו.
- אין ליטול יותר מ-10 טבליות ביום.
- התכשיר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12 שנים.
- יש להימנע משימוש ממושך.
- מומלץ להמתין כשעה-שתיים בין נטילת תרופות אחרות לנטילת רני.
- אין לעבור על המנה המומלצת.

בדיקות ומעקב

- בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו רצוי לערוך בדיקות רמת סידן, מגנזיום ופוספט בדם, ביחוד בחולים הסובלים מאי ספיקת כליות.
- לפני השימוש בתרופה, יש לידע את הרופא במידה והנך נוטל כבר תרופה ממשפחת התיאזידים, היות ויתכן והרופא ירצה לעקוב אחרי רמת הסידן אצלך בדם.

שימוש ממושך במינונים גבוהים של התרופה עלול להוביל לבעיות במערכת העיכול כגון: בחילות, הקאות, עצירות, ולתשישות וחולשת שרירים חריגה. במקרים אלו יש להפסיק את השימוש בתרופה. לפנות מהר לרופא, ולהבטיח צריכת כמויות נאותות של מי. ראה גם פרק 4 "תופעות לוואי" סעיף "יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא בהופעת".

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, בשום אופן אין ליטול מנה כפולה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה שאל את הרופא או הרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול ממך אחת מהן.

במינונים המומלצים תופעות לוואי אינן סבירות.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא בהופעת:

- תופעות אלרגיות **נדירות** שדווחו כגון: פריחה, גרד, קשיי נשימה והתנפחות של הפנים, הפה או הגרון והלם אפילקטי (תגובה אלרגית קשה ומסכנת חיים, תסמינים אפשריים הינם: לחץ דם נמוך, שוק, דפיקות לב, קשיי נשימה, התכווצות מספונות הנשימה, תגובות עוריות, כאבי בטן או התכווצויות, הקאות ושילשול).
- שימוש ממושך במינונים גבוהים של התרופה עלול להיגרם עלייה ברמות הסידן/המגנזיום בדם, ביחוד אצל חולים הסובלים מבעיות בתפקוד הכליות. הדבר עלול להתבטא בתסמינים הבאים: בחילות, הקאות, בעיות קיבה, שלשול, תשישות וחולשת שרירים, לבבול, עלייה בביצור שתן, עלייה בתחושת הצמא והתייבשות.
- שימוש ממושך במינונים גבוהים או בשילוב עם כמויות גדולות של חלב או מוצרי חלב עלול לגרום לתסמונת "מילק אלוקל" המתבטאת ברמות גבוהות של סידן בדם, עלולים להופיע התסמינים הבאים: אובדן חוש הטעם, כאב ראש, הפרעות בכליות, תשישות וכן הופעת גושים מתחת לעור.
- ראה גם פרק "כיצד תשתמש בתרופה?".

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול בתרופה שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. כיצד לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלה** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להשג ידם של ילדים ו/או יתנוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. **אל תגרסם להקאה** ללא הוראה מפורשת מרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- יש לאחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Sucrose, Maize starch pregelatinised, Potato starch, Talc, Magnesium stearate, Paraffin light liquid, Peppermint flavour, Lemon flavour.

כל טבליה מכילה 475 מ"ג סוכרזו.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות לעיסות, מרובעות, קעורות, בצבע קרם לבן, עם הטבעת "RENNIE" בשני הצדדים. הטבליות בעלות ריח מנטה. גדלי אריזה מאושרים: 6, 12, 24, 36, 48, 96 טבליות. יתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

בעל הרישום וכתובתו:

באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45240.

שם היצרן וכתובתו:

דלפארם גאיי, גאיי, צרפת.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר בתאריך: פברואר 2016.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
134 20 28413 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.