

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא /י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

אקמולי® לילדים גדולים
בטעם טוטי-פרוטי
סירופ ללא סוכר

הרכב
כל 5 מ"ל מכילים:
Paracetamol 250 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

אקמולי® לילדים גדולים
בטעם תות שדה
סירופ ללא סוכר

הרכב
כל 5 מ"ל מכילים:
Paracetamol 250 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Xylitol, propylene glycol, glycerin, povidone, sodium citrate dihydrate, acesulfame potassium, citric acid monohydrate, flavour Tutti Frutti, ammonium glycyrrhizinate, flavour vanilla, colour red FDC No 40, colour blue FDC No.2, purified water.

כל מ"ל מכיל 1.17 מ"ג נתרן

Xylitol, propylene glycol, glycerin, povidone, sodium citrate dihydrate, acesulfame potassium, citric acid monohydrate, flavour strawberry 502301T, ammonium glycyrrhizinate, flavour vanilla, color red FDC No. 40, purified water.

כל מ"ל מכיל 1.17 מ"ג נתרן

פעילות רפואית

משכך כאבים ומוריד חום.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.

אם הינך בהריון/מניקה או אם אתה/או ילדך

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

סובלת/ או סבלה/ בעבר מליקוי בתיפקוד הכבד או הכליה/מערכת השתן, אלכוהוליסם או מצהבת.

אזהרות

פרצטאמול עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלה: כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ, ניתן לתקופה ממושכת, שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, כשנוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא. אם אתה/או ילדך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. יש להיוועץ ברופא בעת השימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 3 שנים. יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום. אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח-למניעת מינון יתר/הרעלה של פרצטאמול.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה/או ילדך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת/ זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, לאפילפסיה), תרופות נגד קרישת דם, תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, מטוכולופראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה, ובעיות קיבה אחרות), כולסטרמיין (להפחתת יתר שומני הדם), או תכשירים הממריצים יצור אנזימים בכבד כגון ברביטורטים או פניטואין או קרבמזפין. אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון פריחה, גירויים או סחרחורת.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת הנובעות בדרך כלל ממינון יתר

שילשול, בחילה, הקאה, אובדן תיאבון, כאבי בטן, נפיחות, כאב או רגישות בבטן עליונה (נדיר): יש להפסיק נטילת התרופה ולפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשה הכללית, עליך להתיעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה. ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון
בהעדר הוראה אחרת מהרופא :

ילדים

מצא/י את המינון המתאים בטבלאות.

אם ידוע לך משקל הילד - יש לתת את המינון כפי שמופיע בטבלת המשקל המציינת מינון לפי משקל.
רק במקרה שלא ידוע משקל הילד - יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע בטבלת הגיל המציינת מינון לפי גיל הילד.

טבלת משקל

משקל הילד	מנה במיליגרמים	מספר מנות מקסימלי ליממה
16 ק"ג	4.8	עד 5 פעמים ביממה
17 ק"ג	5.1	עד 5 פעמים ביממה
18 ק"ג	5.4	עד 5 פעמים ביממה
19 ק"ג	5.7	עד 5 פעמים ביממה
20 ק"ג	6	עד 5 פעמים ביממה
21 ק"ג	6.3	עד 5 פעמים ביממה
22 ק"ג	6.6	עד 5 פעמים ביממה
23 ק"ג	6.9	עד 5 פעמים ביממה
24 ק"ג	7.2	עד 5 פעמים ביממה
25 ק"ג	7.5	עד 5 פעמים ביממה
26 ק"ג	7.8	עד 5 פעמים ביממה
27 ק"ג	8.1	עד 5 פעמים ביממה
28 ק"ג	8.4	עד 5 פעמים ביממה
29 ק"ג	8.7	עד 5 פעמים ביממה
30 ק"ג	9	עד 5 פעמים ביממה

טבלת גיל

ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי. לכן יש לעשות מאמץ ולברר את משקל הילד/ה ולקבוע מינון לפי טבלת המשקל. רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד/ה ניתן לקבוע מינון לפי טבלה זו.

גיל הילד	מנה במיליגרמים	מספר מנות מקסימלי ליממה
5-4 שנים	4.8	עד 5 פעמים ביממה
8-6 שנים	6.4	עד 5 פעמים ביממה
10-9 שנים	8	עד 5 פעמים ביממה
11 שנים	9.6	עד 5 פעמים ביממה

אין לעבור על המנה המומלצת או על מספר המנות ביממה

יש ליטול/לתת המנות במרווחים של לא פחות מ- 4 שעות.

ילדים מגיל 12 שנים ומעלה :

10 מ"ל כל 5-4 שעות, לפי הצורך. אין לעבור על המנה המומלצת.

מבוגרים : 10 מ"ל כל 5-4 שעות, לפי הצורך. אין לעבור על 4 גרם של פרצטאמול (המצוי ב 80 מ"ל סירופ) במשך 24 שעות.

אם החום נמשך למעלה מ- 3 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 5 ימים יש לפנות לרופא.

אם הילד נטל בטעות מנה כפולה, יש להיוועץ ברופא או לפנות לחדר מיון.

אופן השימוש

יש להשתמש במזרק המצורף לשם דיוק במינון. כל שנתה (קו) במזרק מודדת 0.1 מ"ל. כדי למדוד את הכמות הרצויה במזרק יש להכניס את גוף המזרק לבקבוק ביד אחת וביד השנייה למשוך את הטובלן (הבוכנה) כלפי מעלה, עד שתוכלי לקרוא את הכמות הרצויה בחלקו העליון של הטובלן (הבוכנה).

יש להכניס את המזרק לפי הילד לכיוון הלחי ולהזליף את תכולתו לאט.

לאחר השימוש ולפני כל הכנסה של גוף המזרק לבקבוק, יש להפריד את חלקי המזרק ולשטוף במים פושרים וסבון.

מנעי הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מוחץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבאי/י אריות התרופה איתך.

אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא !

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת או נותן/ת לילד תרופה.

הרכבי/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו במקום קריר. אין לאחסן במקרר. לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש בתרופה עד לתאריך התפוגה.

גם לפי תנאי הארזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר ! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופא שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה ארזה.

מס. רישום התרופה :

אקמולי לילדים גדולים בטעם תות שדה : 140 18 31762 00

אקמולי לילדים גדולים בטעם טוטי-פרוטי : 140 17 31761 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
ת"ד 3190, פתח-תקוה.