

במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, פרקינסון, אפילפסיה), תרופות נגד קרישת דם, תרופות נגד דיכאון כגון בולמי מונואמין אוקסידאז (ראה/י "מתי אין להשתמש בתכשיר"), תרופות להורדת לחץ דם, תרופות ללא מרשם רופא המכילות פאראצטמול, תרופות אחרות נגד שיעול והצטננות, תרופות המשפיעות על הכבד (כגון: ברביטורטים ותרופות נגד עוויתות), שימוש ממושך בתרופות נגד דלקת פרקים, תרופות למחלות לב (מסוג חוסמי בטה-אדרנרגיים או גליקוזידים דיגיטליים).

**תופעות לוואי:** בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: יובש בפה, נמנום, סחרחורת, עצבנות או חוסר מנוחה, גרויים.

**תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:** בחילה, הקאה או כאב בטן, עליה בלחץ הדם: המשך/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד! קושי או כאב בהטלת שתן (נדיר): המשך/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד! דימום, עייפות או חולשה מיוחדת (נדיר): המשך/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!

גרד ופריחה בעור (נדיר): המשך/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד! בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד. **מינון:** בהעדר הוראה אחרת מהרופא, המינון המומלץ למבוגרים הוא: 1-2 טבליות, 3 פעמים ביום.

מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד! חולים קשישים עשויים להיות רגישים יותר להשפעות של תרופה זו.

**אופן השימוש:** לבלוע את התרופה עם מים. ניתן לחצות או לכתוש את הטבליות מיד לפני בליעתן. אין לאחסן טבליות חצויות או כתושות. **מנע/י הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.

**אין לגרום להקאה** ללא הוראה מפורשת מרופא! **אין ליטול תרופות בחושך!** יש לבדוק את התוויית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

**אחסנה:** לשמור במקום קריר ואפל. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' רישום התרופה:** 1260730479

**יצרן:** סס-און בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

## ברונכולט פלוס טבליות

**הרכב:** כל טבליה מכילה: Paracetamol 400 mg, Pseudoephedrine HCl 30 mg, Diphenhydramine HCl 20 mg

חומרים בלתי פעילים: Sodium Starch Glycolate, Colloidal Anhydrous Silica, Quinoline Yellow Al, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Purified Water, Sepifilm LP 770

**פעילות רפואית:** להקלה סימפטומטית בהצטננות, בשיעול ובגודש באף, המלווים בחום ובכאבים. כטיפול נלווה לגודש באוזן התיכונה.

### מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמש בתכשיר כאשר הינך מיניקה. אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה. אין לתת תרופה זו לחולים העוברים טיפול עם בולמי מונואמין אוקסידאז וגם תוך שבועיים מיום הפסקת טיפול כזה.

### אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון. אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הלב ו/או כלי דם, עיניים (כגון גלאוקומה), הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון אולקוס), בלוטת התריס (תירואיד), בלוטת הערמונית, סוכרת, לחץ דם גבוה, מחלות נפשיות.

### איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

**אזהרות:** פאראצטמול עלול לגרום לנזק לכבד במקרים הבאים: כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ, כאשר ניתן לתקופה ממושכת, כאשר שותים משקאות אלכוהולים בתקופת הטיפול וכאשר נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על הכבד. אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים, או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח - למניעת מינון יתר/הרעלה של פאראצטמול.

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה. לפני כל נתוח (כולל נתוח שיניים) או טיפול דחוף, עליך להודיע לרופא על נטילת תרופה זו. יש להפסיק את הטיפול בתרופה זו 4 ימים לפני בצע טסטים של תגובות על העור. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא.

**תגובות בין תרופתיות:** אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.