דקסמול® **קולד** לטיפול ביום, קפליות

1214971113-J

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986.

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

כל קפלית מכילה:

Paracetamol	325 mg
Guaifenesin	200 mg

פראצטמול 325 מ"ג
גואפנסין 200 מ"ג
פסאודואפדרין הידרוכלוריד 25 מ"ג
Pseudoephedrine HCl 25 mg
דקסטרומתורפאן הידרוברומיד 10 מ"ג
Dextromethorphan Hydrobromide 10 mg

רשימת המרכיבים הבלתי פעילים בתחשיר – ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה לרופא או לחוקר.

תרופה זו מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 12 בלבד, מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא.

עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היזעקו ברופא או בחוקר אם הינך זקוק למידע נוסף.

אם הינך מרגיש כי התרופה אינה יעילה יותר מ-3 ימים או אם סימני המחלה מחמירים או לא משתפרים לאחר 3 ימים למרות השימוש בתרופה או בכל מצב שבו מופיעים תסמינים חדשים.

1. למה מיועדת התרופה?

להקלה סימפטומטית של הצטננות, שיעול וגודש באף המלווה בחום ובכאבים, לטיפול ביום.

קבוצה תרפויטית:
- פראצטמול – משכך כאבים ומוריד חום.
- גואפנסין – מכיח שמסייע לשחרר את הליחה והנחפשות שהצטברו בדרכי הנשימה כתוצאה מהצטננות.
- פסאודואפדרין הידרוכלוריד – אמין סימפאטומימטי המקל על מלזת, גודש באף ובאוזניים המלוות הצטננות ו/או טיסיטיס.
- דקסטרומתורפאן הידרוברומיד – מדכא שיעול המלווה הצטננות.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:
- הינך בהריון או מניקה.
- הינך מתחת לגיל 12 שנים.
- אתה רגיש לחומרים הפעילים (פראצטמול, פסאודואפדרין, גואפנסין דקסטרומתורפאן) או לאחד מרכיבי התרופה או למדיצ גודש אחרים.
- הינך מטופל בזמנית בתרופות מונקבוצות הבאות: מעכבי מונואמין אוקסידאז MAOIs (למעל לטיפול בדיכאון) או בתוך 14 יום מהפסקת הטיפול בהן; SSRIs (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין); מנדי גודש, תרופות אחרת נגד שיעול והצטננות, חומסי בטא (למעל לטיפול בבעיות הלב או יתר לחץ דם).

אין להשתמש בתכשיר להקלה על שיעול כרוני.
אין להשתמש בתכשיר זה גם זמנית עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול. (אם אינך בטוח שהתרופה שהינך מטל מכילה פראצטמול, **היוועץ ברופא** או הרוקח).
- הינך סובל מגמגום.
- הינך מתחת לגיל 12 שנים.
- אתה רגיש לחומרים הפעילים (פראצטמול, פסאודואפדרין, גואפנסין דקסטרומתורפאן) או לאחד מרכיבי התרופה או למדיצ גודש אחרים.
- הינך מטופל בזמנית בתרופות מונקבוצות הבאות: מעכבי מונואמין אוקסידאז MAOIs (למעל לטיפול בדיכאון) או בתוך 14 יום מהפסקת הטיפול בהן; SSRIs (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין); מנדי גודש, תרופות אחרת נגד שיעול והצטננות, חומסי בטא (למעל לטיפול בבעיות הלב או יתר לחץ דם).

אין להשתמש בתכשיר להקלה על שיעול כרוני.
אין להשתמש בתכשיר זה גם זמנית עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול. (אם אינך בטוח שהתרופה שהינך מטל מכילה פראצטמול, **היוועץ ברופא** או הרוקח).
- הינך סובל מבעיות בכליות.
- הינך מתחת לגיל 12 שנים.
- אתה רגיש לחומרים הפעילים (פראצטמול, פסאודואפדרין, גואפנסין דקסטרומתורפאן) או לאחד מרכיבי התרופה או למדיצ גודש אחרים.
- הינך מטופל בזמנית בתרופות מונקבוצות הבאות: מעכבי מונואמין אוקסידאז MAOIs (למעל לטיפול בדיכאון) או בתוך 14 יום מהפסקת הטיפול בהן; SSRIs (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין); מנדי גודש, תרופות אחרת נגד שיעול והצטננות, חומסי בטא (למעל לטיפול בבעיות הלב או יתר לחץ דם).

אין להשתמש בתכשיר להקלה על שיעול כרוני.
אין להשתמש בתכשיר זה גם זמנית עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול. (אם אינך בטוח שהתרופה שהינך מטל מכילה פראצטמול, **היוועץ ברופא** או הרוקח).
- הינך סובל מבעיות בכליות.
- הינך מתחת לגיל 12 שנים.
- אתה רגיש לחומרים הפעילים (פראצטמול, פסאודואפדרין, גואפנסין דקסטרומתורפאן) או לאחד מרכיבי התרופה או למדיצ גודש אחרים.
- הינך מטופל בזמנית בתרופות מונקבוצות הבאות: מעכבי מונואמין אוקסידאז MAOIs (למעל לטיפול בדיכאון) או בתוך 14 יום מהפסקת הטיפול בהן; SSRIs (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין); מנדי גודש, תרופות אחרת נגד שיעול והצטננות, חומסי בטא (למעל לטיפול בבעיות הלב או יתר לחץ דם).

אין להשתמש בתכשיר להקלה על שיעול כרוני.
אין להשתמש בתכשיר זה גם זמנית עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול. (אם אינך בטוח שהתרופה שהינך מטל מכילה פראצטמול, **היוועץ ברופא** או הרוקח).
- הינך בהריון או מניקה