

עלון לצרכן לפי תקנות החוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התכשיר נמכר ללא מרשם רופא

גביסקון טבליות מנטה

החומרים הפעילים וכמותם:

Sodium alginate 250 mg
Sodium bicarbonate 133.5 mg
Calcium carbonate 80 mg

סודיום אלגינאט 250 מ"ג
סודיום ביקרבונאט 133.5 מ"ג
קלציום קרבונאט 80 מ"ג

יחומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 בעלון.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. התרופה מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים, מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בסימפטומים של ריפלוקס (העלאת מזון) קיבתי-ושטי, כגון העלאת מיצי קיבה חומציים, צרבת וקשיי עיכול (הקשורים לריפלוקס), לדוגמא, בעקבות ארוחות או במהלך הריון, או בחולים עם סימפטומים הקשורים לריפלוקס (העלאת מזון) ושטי.

קבוצה תרפויטית: מדכאי ריפלוקס (העלאת מזון).

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתכשיר אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 בעלון), היות ותועדו מקרים נדירים של קשיים בנשימה ופריחה עורית.

אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה:

כל טבליה מכילה כ- 61.5 מ"ג נתרן וכ- 80 מ"ג סידן. אם עליך להגביל את כמות הנתרן או הסידן בתזונתך, התייעץ עם רופא לפני השימוש בתרופה.

התרופה מכילה אספרטם, שהוא מקור לפנילאלין, האסור לחולי פנילקטונוריה.

אם אתה לוקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות דרך הפה היות והתרופה יכולה לשבש את פעולת התרופות האחרות.

הריון והנקה:

ניתן להשתמש בתרופה אם את בהריון או מניקה, אך כמו בכל תרופה, יש לצמצם את משך הטיפול ככל הניתן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. התרופה מיועדת לנטילה דרך הפה בלבד, יש ללעוס היטב לפני הבליעה.

המינון המקובל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 2-4 טבליות ללעיסה לאחר

ארוחה ולפני השינה.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 12 שנים. אם לא חל שיפור במצבך לאחר 7 ימים יש לפנות לרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עלולה להופיע תחושת נפיחות. לא סביר כי זה יגרום לך לנזק, אך יש לבדוק עם הרופא או הרוקח. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בגביסקון טבליות מנטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא במקרה של תגובה אלרגית כגון: פריחה בעור, גרד, קשיי נשימה, סחרחורת או התנפחות של הפנים, שפתיים, לשון וגרון. תופעות אלו מופיעות לעיתים נדירות מאד.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

• **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי אריזת הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **תנאי איחסון:** אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C. אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם - Mannitol, Macrogol 20,000, Copovidone, Peppermint flavour, Magnesium stearate, Acesulfame potassium, Aspartame.

כל טבליה מכילה 3.75 מ"ג אספרטם, כ- 61.5 מ"ג נתרן וכ- 80 מ"ג סידן. התרופה אינה מכילה סוכר או גלוטן.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות בצבע חלבי, מנוקד מעט. האריזה מכילה 16, 36 או 48 טבליות ללעיסה. לא כל האריזות משווקות.

בעל הרישום: רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ, הנגר 6, הוד השרון. 45240.

יצרן: רקיט בנקיזר הלתיקר (אנגליה), דנסום ליין, הל, אנגליה.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך 08/2014

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות: 141-58-31757-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.