

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 . התרופה משווקת ללא מרשם רופא.

אומפרדקס Z - קפליות, 20 מ"ג

כל קפליה מכילה: אומפרדז 20 מ"ג
20 mg Omeprazole

רשימת החומרים הבלתי פעילים מופיעה בסעיף 6.
רשימת החומרים הבלתי פעילים מופיעה בסעיף 6.

קפליות מיועדות למבוגרים מעל גיל 18. עלֵך לטול אותה בורה בנות. היועץ ברקוח אם הריך **קזק** למידע נספך. משך הטיפול בתרופה הוא 14 יום. עלֵך לפנות אל הרופא אם סימני המחלה (סימפטומים) מתמרים או אינם משתפרים לאחר 14 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?
קפליות אומפרדקס Z מיועדות לטיפול בתחלת תסמינים מוגדרים מחדש של מחלה של מחלה של **חומצה במחלה** לטוש (הנבעת: צרבת) המופיעים בתדירות של לפחות יומיים שבוע, במבוגרים מעל גיל 18.
קביעה תרופתית: מעכב שיימוש בתרופה (PPI).

2. לפני שיימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה גרש (אלרגי) לחומר הפעיל (אומפרדזול) לכל אחד מהמרכיבים הנספכים אשר מכילה התרופה או לעמקם משאבות פרוטונים (PPI) (גנ): פנטופרזול, לוספרזול, רבפרזול או אסאנופרזול.
- אם הריך נטל **פליצבר** (טיפול בגניף HIV).

אזהרות מיוחדות המגעות לשימוש בתרופה:
לפני השימוש באומפרדקס Z, סרו רופא אם:
• הריך בהריון, עשויה להיות בהריון, מתכנת להיכנס להריון או מניקה (ראי סעיף "הריון והנקה").

- סבל בעבר מוכי קיבה או עשברת בעבר ניתוח במערכת העיכול.
- אתה נוטל תרופה מתמשך תרופות לטיפול סטטינמי של צרבת או הפרעות עיכול במשך 4 שבועות ומעלה.
- הריך סובל מקשיי עיכול או צרבת במשך 4 שבועות או יותר (כולל להביע על מצב חמור יותר).
- הריך סובל או סבל בעבר מליקוי בתפקוד הכבד או ממחלת כבד או צמצמת.
- הריך מעל גיל 55 עם תסמינים חדים או תסמינים שהשתנו לאחרונה.
- הריך סובל ממחלות, מערכת המלווה בטשטוש, חזקה או סחרחורת; מאכבים בוחו או בכתפיים המלווים בקוצר נשימה, חזקה, כאב מתחיל, לרעות, לזאור או לתסמינים, שטשטוש או סחרחורת; כאב עיזק ותכופים; מצנצפים (קשיש שימח) תכופים, בעיקר אם מלווים בצרבת.
- נאמר לך כי יש לך רגה נמוכה של מגנזיום בדם. יש להתייעץ עם הרופא על ניטור רמת המגנזיום בדם במהלך הטיפול בתרופה. זו.
- הריך גרש לזמן מלפנה או לתרופה לזשה.

משך הטיפול בתרופה הוא 14 יום. מומץ לטול את התרופה יותר מ-14 יום או יותר מטפול אחד (14 יום) כל 4 חודשים. אין לטול את התרופה לטיפול מוגז. אם אויך את הליה או אם הצרבת נמשכת או מתמרה או שהסימפטומים מהם אתה עטל מתמרים, יש להפסיק את הטיפול ולהתייעץ עם הרופא.

השימוש בתכשיר מקבוצת מעכבי משאבות פרוטונים PPI כגון אומפרדקס במיוחד למשך זמן פשוה עלול להגדיל במעט את הסיכונים לשרים לפרך. שרוש פי הרוב נבאמד ומועדת, עלֵך לספר לרופא אם הריך סובל מאסטיאורידה או אם הריך סובל מקוויטוטרואידיים (העולמים להגדיל את הסיכון לאסטיאורידה).
• אומפרדקס מכילה את רמת החומציות בקיבה, חומציות הקפיצה מדרשת לסיפנה של וטימן B2. אם אתה נוטל את התרופה לקהופה ממושכת יש להתייעץ עם הרופא לגבי האפשרות לחסר בוטימן B12.

התרופה יכולה למסך סימנים למחלות אחרות, לכן **אם הריך סובל מהתסמינים הבאים לפני השימוש במהלך פנה מיד לרופא וספר לו על כך:**
• ירידה במשקל, תשיבה או כל: בריחה, בעיה במהלך הליעה (למשל קשיש או כאב)
• כאב בטן או קשיש עיכול
• הקאת אילוף או הקאת מדימת
• הפרשת צואה שחורה (צואה דמית)
• קישלו חמור או ממושך (אומפרדזול נמצא קשור לעיזק קלה בשלשול זיהומי)

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:
• גליפניציד (תיחה לטיפול בגניף HIV) ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה".
• קלופיזוגרל (נמיעת קרישי דם (פקקת)) דוחו כי תרופות מקבוצה זו (PPI), כגון אומפרדזול, עלולות להפחית את הפעילות של קלופיזוגרל ולכן יש להמנע ממניית התרופה עם קלופיזוגרל.
• סאטנזיד, קטיוויבר, ריטנזיד (תרופות לטיפול בגניף HIV).

• סקווקומול, אסירוקומול, פוסקומול ווריקומול (תרופות לטיפול ביהומים פטרייתיים).
• דיאקסין (למחלות לב).
• תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון פניטואין, אפילפטין, דיאזפאם (חרדה) הרפית שריים או אפילפטין) אם הריך נוטל פניטואין, יתיחה צורך במעקב רפואי עם התחלת הטיפול באומפרדקס Z וטימן K אחרים. יתיחה צורך במעקב רפואי עם התחלת הטיפול באומפרדקס Z וטימן K אחרים.

• טולטוזול (לסאב רגליים).
• קטריליום, מקופולאט מופטיל (מדאס מערכת החיסון).
• תכשירים המכילים ברזל.
• דיסולפירם (לגמילה).
• תרופה מצומדת המכילה היפיקום פופרוטום (St John's wort) המשמשת לטיפול בדיאנון).
• אלוטוידי (לטיפול בסרטן).
• מוטירקסט - יתכן והרופא שלך יפסיק באופן זמני את השימוש באומפרדקס Z.
• אנטיוטיקה כגון קלריתומיצין, אמפיצילין, ריפמיציין (לטיפול בשחפת).

שימוש בתרופה וזמן
יש לטול התרופה לפני הארוחה, עדיף בבוקר.
הריון והנקה:
את בהריון, עשויה להיות בהריון, מתכנת הריון או מניקה (ראי סעיף "הריון והנקה").
ההיגוי ושימוש במכונות:
השימוש בתרופה עלול לגרום לתופעות לואי כגון סחרחורת ותופעות בריאה (ראי סעיף "תופעות לואי"). אם תופעות אלו מתרחשות יש להימנע מנהיגה ברכב ומהפעלת מכונות מוכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
תרופה זו מכילה לטוזול. אם נאמר לך בעיניי, יש די רופא שיש לך אי סבילות לטוזולים מרשים, יש להייעץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

3. כיצד משתמש בתרופה?
עלֵך לבדוק עם הרופא אם הריך או איך בטוח. תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבררים מתחת לגיל 18. **המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים** הוא 20 מ"ג פעליה אחת פעם ביום לפני הארוחה הקהופה על 14 יום.
אין לעבור על המנה המומלצת
יש לבלוע הקפליה בשלמותה עם כוס מלאה מים או לתלוש, לחכות או ללועט את הקפליה על מנת לשמור על היציבה של הקפליה (הציפוי מוגז מחומרי העיכול בקיבה לפרק את הקפליה על מנת שהחומר הפעיל ישתחרר רק במעי היין שהחומר הפעיל נספג לגוף)

תרופה זו מכילה לטוזול. אם נאמר לך בעיניי, יש די רופא שיש לך אי סבילות לטוזולים מרשים, יש להייעץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

4. כיצד משתמש בתרופה?
עלֵך לבדוק עם הרופא אם הריך או איך בטוח. תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבררים מתחת לגיל 18. **המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים** הוא 20 מ"ג פעליה אחת פעם ביום לפני הארוחה הקהופה על 14 יום.
אין לעבור על המנה המומלצת
יש לבלוע הקפליה בשלמותה עם כוס מלאה מים או לתלוש, לחכות או ללועט את הקפליה על מנת לשמור על היציבה של הקפליה (הציפוי מוגז מחומרי העיכול בקיבה לפרק את הקפליה על מנת שהחומר הפעיל ישתחרר רק במעי היין שהחומר הפעיל נספג לגוף)

משך הטיפול:
עד 14 יום. יתכן כי יעברו 2-3 ימים עד להשפעה מלאה של התרופה. אם לא עלת שיפור במצבך לאחר 14 יום יש לפנות לרופא. ניתן לזרוח על טיפול בן 14 יום או 4 חודשים. אין לטול את התכשיר יותר מ-14 יום או יותר בתרופה אחת (14 יום) כל 4 חודשים אלא על פי הוראות רופא. אם התסמינים חוזרים לעיתים תכופות או מתמרים, יש לפנות לרופא.

בידוק מקבץ:
עלֵך ליידיע את הרופא במידה והריך עומד לעבור בדיקות מעבדה, יתכן שהרופא יורה לך על הפסקת הטיפול בתרופה שבועיים לפני הבדיקות. יש להתייעץ עם הרופא לגבי ניטור רמת המגנזיום בדם במהלך פניטואין או מדללי דם, הטיפול שלך יפנה אותך לבדיקות בחתיחה ובסימני הטיפול.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע יתר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון בית-חולים והבא אפירות התרופה איתך. אין לגחם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אם שכחת לטול תרופה זו בזמן הדרוש יש לטול מנה מיד שתזכרת, אך אם זמן נטילת המנה הבאה קרוב יש לדלל על המנה שנשכחה ולהיעזר בזמני הנטילה הרגילים. בשום אופן אין לטול שתי מנות ביחד.

אין לטול תרופות בוחשין (בזק תזונתי והמנה כלל פעם שרייך נוטל תרופה. הרכב מפקקים אם הריך לקח דלקת.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברקוח.

4. תופעות לואי
כמו כל תרופה, השימוש באומפרדקס Z עלול לגרום לתופעות לואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואי. יתכן ולא תסבול מלקף אחת מהן.

לרופא אם:
• התפרחות הגבנה אלוטית או אפילקטית (מתבטאת בקוצר נשימה, צלצופים פתאומיים, ונפיחות בגוף, באזון הפנים, שבתיים, הלשון או הגרון, פריחה, עלפון או בעיות בבלעיה). תגובה זו יכולה לעיתים להיות סוג חמורה מאד.
• אתה סובל ממצומדות בעור עם שלפוחיות או קליף בעור; שלפוחיות חמורות או דימום בשפתיים, בעיניים, כפה, באף ובאבר המין. כולל להיות מלווה בחום ובכאב מפיקים.

• הריך סובל מציבת (הצהבת העור, עיניים וציפורניים צהובות, שתי כהה), עייפות (לולים להיות סימנים של בעיות כבד).
• סימנים של רמות נמוכות של נתרן ומגנזיום כגון: התכווצות, סחרחורת, קוצב לב או תקין או הפרעות בקצב הלב, אי שקט, עצבנות, עוית פתאומית, רעד, חולשת שריים, התכווצות בדיים וברגליים, תשלוש שריים או כאב שריים, התכווצות בגרון. יש להתייעץ עם הרופא אם מופיעה אחת מהצורות הבאות בזמן טיפול בתרופה זו.

תופעות לואי נוספות:
תופעות לואי שכיחות (מופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100):
• כאב ראש, כאב בטן, עצירות, שלשול, גזים, בחילה, הקאה.

תופעות לואי שאינן שכיחות (מופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):
• נפוחות ברגליים ובקטוליים; סחרחורת, ורטיו, הרגשת עלפון, תחושת נימול, נמנמם בעיזק, שביה, פריחה, גירוד, חרלת (hives), דלקת בעור (דרמטיטיס), הרגשה כללית לא טובה וחוסר אנרגיה, שטיים בבדיקות דם (שישי בתפקודי כבד).

תופעות לואי: **דירות** (מופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):
• תופעות במערכת הדם (כגון: ירידה בספירת תאי הדם הלבנים או בספירת הדם) העולות לגרום לחולשה,

עייפות, חבורות, דימום או לזיהומים תכופים המלווים בחום ובצמרזמות קשות, כאב גרון, כיבים בפה.

• תגובות אלרגיות, לעיתים חמורות מאוד, כולל נפוחות בשפתיים, בלשון ובגרון, חום וצנצפים. רמת נתרן נמוכה בדם- עלול לגרום לחולשה, הקאה, התכווצות.
• קשיש עיניים בטעם.
• עצבנות, ירידה על שקט, כלבול או דיאנון.
• צנצפים פתאומי או קוצר נשימה (התכווצות הסימפונות).
• יובש בפה.

• כאבים בפה, דלקת בתוך חלל הפה.
• פטרת בפה או בוחש.
• זיהומים פטרייתיים היכולים להשפיע על המעי.
• בעיות בכבד, כולל צהבת המתבטאת בעור צהוב, שתי כהה ועייפות.

• גרישות יתר של העור לאור, יכולה להתבטא כפריחה. נשירה או דיורל שיער באופן חריג.
• נפוחות במפקקים מלווה בכאבים, כאבי שריים או חולשת שריים.
• בעיות חמורות בכליות.
• זיעה מוגברת.

תופעות לואי: **דירות מאד** (מופיעות בכחות מ- 1 מתוך 10,000 משתמשים):
• שיניים בספירת דם כולל מחסור בכדוריות דם לבנות (אגרנולוציטוזיס).

• תופעות.
• הזיות (ראייה או תחושה של דברים לא קיימים).
• בעיות חמורות בכבד הגורמות לאי ספיקת כבד ודלקת כבד.
• התפרצות פתאומית של פריחה חמורה או שלפוחיות או קליף של העור. יתכן ויהיו מלווים בחום ובכאב פרוקים (ארימתה מולטיפורמה, תסמונת סטיבנס-גונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס).

תופעות לואי שחירות לזיזוע:
• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.

• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.
• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.
• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.

• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.
• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.
• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.

לעיתים יליתים לרמות כדוריות הדם הלבנות, דבר הגורם לפגיעה במערכת החיסונית. במידה והריך נטל סוגל ממחלה זיהומית המתבטאת בחום עם ירידה חמורה במצב בריאותך הכללי או חום עם סימפטומים של זיהום מקומי כגון כאבים בצוואר, בגרון, או בפה, או סחרחורת, או עליה בדופק הלב. במידה והריך נטל אחת מתופעות אלו עלֵך לספר לרופא הרופא הרגום. רמות מגנזיום נמוכות עלולות גם לגרום לירידה ברמות אשלגן או סידן בדם. הרופא ישקול לבצע בדיקות דם סדירות על מנת לנטר את רמות המגנזיום שלך בדם.

לעיתים יליתים לרמות כדוריות הדם הלבנות, דבר הגורם לפגיעה במערכת החיסונית. במידה והריך נטל סוגל ממחלה זיהומית המתבטאת בחום עם ירידה חמורה במצב בריאותך הכללי או חום עם סימפטומים של זיהום מקומי כגון כאבים בצוואר, בגרון, או בפה, או סחרחורת, או עליה בדופק הלב. במידה והריך נטל אחת מתופעות אלו עלֵך לספר לרופא הרופא הרגום. רמות מגנזיום נמוכות עלולות גם לגרום לירידה ברמות אשלגן או סידן בדם. הרופא ישקול לבצע בדיקות דם סדירות על מנת לנטר את רמות המגנזיום שלך בדם.

לעיתים יליתים לרמות כדוריות הדם הלבנות, דבר הגורם לפגיעה במערכת החיסונית. במידה והריך נטל סוגל ממחלה זיהומית המתבטאת בחום עם ירידה חמורה במצב בריאותך הכללי או חום עם סימפטומים של זיהום מקומי כגון כאבים בצוואר, בגרון, או בפה, או סחרחורת, או עליה בדופק הלב. במידה והריך נטל אחת מתופעות אלו עלֵך לספר לרופא הרופא הרגום. רמות מגנזיום נמוכות עלולות גם לגרום לירידה ברמות אשלגן או סידן בדם. הרופא ישקול לבצע בדיקות דם סדירות על מנת לנטר את רמות המגנזיום שלך בדם.

5. איך לאחסן את התרופה?
• מנע הערלהו התרופה זו וכל תרופה אחרת של לשמור במקום סגור מחוץ לרישע ידם וריאיים של ילדים ו/או עיתקות ועל ידי כך תמנע הערלה. אל תגרסם

להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אונת חודש.
• אין לאחסן בסטמפרטורה מעל 25°C. אחסן באריזה מוקשרת.

6. מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
Lactose monohydrate, Hypromellose acetate succinate, Magnesium carbonate heavy, Sodium starch glycolate, Talc, Sodium stearyl fumarate, Triethyl citrate, Propylene glycol, Titanium dioxide, Sodium hydroxide, Sodium laurilsulfate, Red iron oxide (E-172), Hypromellose 2910, Yellow iron oxide (E-172), Carnauba wax.

כל קפליה מכילה כ- 193 מ"ג לטוזול.
טפדת בפה או בוחש.
זיהומים פטרייתיים היכולים להשפיע על המעי.
בעיות בכבד, כולל צהבת המתבטאת בעור צהוב, שתי כהה ועייפות.

גרישות יתר של העור לאור, יכולה להתבטא כפריחה. נשירה או דיורל שיער באופן חריג.
נפוחות במפקקים מלווה בכאבים, כאבי שריים או חולשת שריים.
בעיות חמורות בכליות.
זיעה מוגברת.

תופעות לואי: **דירות מאד** (מופיעות בכחות מ- 1 מתוך 10,000 משתמשים):
• שיניים בספירת דם כולל מחסור בכדוריות דם לבנות (אגרנולוציטוזיס).

• תופעות.
• הזיות (ראייה או תחושה של דברים לא קיימים).
• בעיות חמורות בכבד הגורמות לאי ספיקת כבד ודלקת כבד.
• התפרצות פתאומית של פריחה חמורה או שלפוחיות או קליף של העור. יתכן ויהיו מלווים בחום ובכאב פרוקים (ארימתה מולטיפורמה, תסמונת סטיבנס-גונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס).

תופעות לואי שחירות לזיזוע:
• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.

• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.
• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.
• דלקת מעיים הגורמת לשלשול חריף שאינו מפקיק או המלווה בכאב בטן עזים וחום.

לעיתים יליתים לרמות כדוריות הדם הלבנות, דבר הגורם לפגיעה במערכת החיסונית. במידה והריך נטל סוגל ממחלה זיהומית המתבטאת בחום עם ירידה חמורה במצב בריאותך הכללי או חום עם סימפטומים של זיהום מקומי כגון כאבים בצוואר, בגרון, או בפה, או סחרחורת, או עליה בדופק הלב. במידה והריך נטל אחת מתופעות אלו עלֵך לספר לרופא הרופא הרגום. רמות מגנזיום נמוכות עלולות גם לגרום לירידה ברמות אשלגן או סידן בדם. הרופא ישקול לבצע בדיקות דם סדירות על מנת לנטר את רמות המגנזיום שלך בדם.

לעיתים יליתים לרמות כדוריות הדם הלבנות, דבר הגורם לפגיעה במערכת החיסונית. במידה והריך נטל סוגל ממחלה זיהומית המתבטאת בחום עם ירידה חמורה במצב בריאותך הכללי או חום עם סימפטומים של זיהום מקומי כגון כאבים בצוואר, בגרון, או בפה, או סחרחורת, או עליה בדופק הלב. במידה והריך נטל אחת מתופעות אלו עלֵך לספר לרופא הרופא הרגום. רמות מגנזיום נמוכות עלולות גם לגרום לירידה ברמות אשלגן או סידן בדם. הרופא ישקול לבצע בדיקות דם סדירות על מנת לנטר את רמות המגנזיום שלך בדם.

לעיתים יליתים לרמות כדוריות הדם הלבנות, דבר הגורם לפגיעה במערכת החיסונית. במידה והריך נטל סוגל ממחלה זיהומית המתבטאת בחום עם ירידה חמורה במצב בריאותך הכללי או חום עם סימפטומים של זיהום מקומי כגון כאבים בצוואר, בגרון, או בפה, או סחרחורת, או עליה בדופק הלב. במידה והריך נטל אחת מתופעות אלו עלֵך לספר לרופא הרופא הרגום. רמות מגנזיום נמוכות עלולות גם לגרום לירידה ברמות אשלגן או סידן בדם. הרופא ישקול לבצע בדיקות דם סדירות על מנת לנטר את רמות המגנזיום שלך בדם.

לעיתים יליתים לרמות כדוריות הדם הלבנות, דבר הגורם לפגיעה במערכת החיסונית. במידה והריך נטל סוגל ממחלה זיהומית המתבטאת בחום עם ירידה חמורה במצב בריאותך הכללי או חום עם סימפטומים של זיהום מקומי כגון כאבים בצוואר, בגרון, או בפה, או סחרחורת, או עליה בדופק הלב. במידה והריך נטל אחת מתופעות אלו עלֵך לספר לרופא הרופא הרגום. רמות מגנזיום נמוכות עלולות גם לגרום לירידה ברמות אשלגן או סידן בדם. הרופא ישקול לבצע בדיקות דם סדירות על מנת לנטר את רמות המגנזיום שלך בדם.