

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

קרא / י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

לוסק®
כמוסות

הרכב
כל כמוסה מכילה:
Omeprazole 20 mg

מרכיבים בלתי פעילים:
Mannitol, methacrylic acid copolymer, lactose anhydrous, hypromellose, hydroxypropylcellulose, polyethylene glycol, micro crystalline cellulose, disodium phosphate dihydrate, sodium laurilsulfate, gelatine, red iron oxide, titanium dioxide, water.
כל כמוסה מכילה 8 מ"ג לקטוז.

קבוצה תרופית
מעכבי משאבת פרוטונים (PPI).

פעילות רפואית
מעכב הפרשת חומצה במערכת העיכול.

התוויות מאושרות
לוסק כמוסות מיועד להקלה בתסמיני זרם חוזר (לדוגמה צרבת) המופיעים בתדירות של פעמיים בשבוע או יותר בחולים מעל גיל 18.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.
אין להשתמש בתרופה בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.
אין להשתמש בתרופה זו אם הינך סובל/ת מכאב במהלך בליעת מזון, מהקאות דמיות או מצואה דמית או שחורה.
אין להשתמש בתרופה אם הינך נוטל/ת אטזנביר (תרופה לטיפול בנגיף HIV).
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
אם הינך בהריון, חושבת שאת בהריון, מתכננת להיכנס להריון, או מניקה, אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הכבד, מצרבת לתקופה העולה על 3 חודשים או אם הינך נוטל/ת תרופות לטיפול בצרבת או בהפרעות עיכול למשך זמן ממושך, מאובדן משקל מסיבה לא ברורה, מבחילות או הקאות, מכאבי בטן, מצרבת המלווה בטשטוש, הזעה או סחרחורת, מכאבים בחזה או בכתפיים המלווים בקוצר נשימה, הזעה, כאב המקרין לזרועות, לצוואר או לכתפיים, טשטוש או סחרחורת, כאבי חזה תכופים, מצפצופים (קשיי נשימה) תכופים, בעיקר אם מלווים בצרבת.

אזהרות
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז.
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 18.
אין לעבור על תקופת הטיפול המומלצת.

תגובות בין-תרופתיות
אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות כולל תרופות שרכשת ללא מרשם רופא, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: פניטואין [לאפילסיה], תרופות לשינה או לחרדה כגון דיאזפם), נוגדי קרישה (כגון קומדין) או חוסמי ויטמין K אחרים, תכשירים המכילים ברזל, תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים כגון קטוקונזול, איטרקונזול, ווריקונזול, אמפיצילין, דיגוקסין (למחלות לב), דיסולפירם (לגמילה), ציקלוספורין, טקרולימוס (מדכאי מערכת החיסון), תיאופילין (לאסתמה).

תופעות לוואי
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון:
תופעות לוואי שכיחות
כאב ראש, שלשול, עצירות, כאבי בטן, בחילה (הרגשת חול), הקאות, גזי מעיים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות
סחרחורת, תחושת נימול, תחושה של קלות ראש, הרגשת עלפון, נמנום, בעיות בשינה, מחלת כבד שעלולה לגרום להצהבת העור העיניים, פריחה, גירוד, דלקת בעור (דרמטיטיס), הרגשה כללית לא טובה.

תופעות לוואי נדירות
גדילת שדיים אצל גברים, יובש בפה, כאבים בפה, פטריית בפה או בגרון, בעיות במערכת הדם העלולות לגרום לזיהומים תכופים מלווים בחום, צמרמורות קשות, כאב גרון, כיבים בפה, דימום או נטייה לחבלה בקלות, עייפות, כשל

כבדי הגורם לנזק מוחי, נפחות מפרקים מלווה בכאבים, כאבי שרירים או חולשת שרירים, אין אונות, רגישות יתר של העור לאור, שלפוחיות חמורות בעור, שלפוחיות חמורות ודימום בשפתיים, בעיניים, בפה, באף ובאברי המין, נשירה או דילול שיער באופן חריג, תגובות אלרגיות לעיתים חמורות מאוד הכוללות התנפחות השפתיים, הלשון והגרון, חום, צפצופים, מחלות בכליה, הזעת יתר, טשטוש ראייה, הפרעות בטעם, רמות נתרן נמוכות בדם.
אם הינך חש/ה מאוד לא טוב, את/ה עלולה לחוש בלבול, עצבנות, תוקפנות, דיכאון, או הזיות.
אם הינך סובלת/מאחת מתופעות הלוואי הנ"ל, או אם הינך חש/ה בסימפטומים אחרים לא רגילים או בלתי צפויים, עליך להיוועץ ברופא או ברוקח.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

עליך לפנות לרופא מיד אם התפתחה תגובה אלרגית (מתבטאת בפרחה מגרדת [חרלת], קוצר נשימה והתנפחות הפנים השפתיים, הלשון או הגרון), כאב גרון או חום מסיבה לא ברורה, בעיות במערכת השתן, כאב וכיבים בפה, עייפות וחולשה מוגברת או אם התפתחה אצלך צהבת (עיניים וציפורניים צהובים ושתן בצבע ירוק-צהוב).
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון

המינון המומלץ למבוגרים מגיל 18 ומעלה בהעדר הוראה אחרת מרופא הינו :
כמוסה אחת פעם ביום לפני הארוחה לתקופה של 14 יום.
אין לעבור את המינון היומי המומלץ.
ניתן לחזור על טיפול בן 14 ימים כל 4 חודשים.
אין ליטול את התכשיר יותר מ-14 יום או יותר מטיפול אחד (14 יום) כל 4 חודשים אלא על פי הוראות הרופא.
אם לא חל שיפור במצבך לאחר 14 יום ו/או התסמינים חוזרים לעיתים תכופות או מחמירים, יש לפנות לרופא.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 18 שנים.

אופן השימוש

אין ללעוס! לבלוע הטבליות עם כוס מלאה של מים.
יש ליטול התרופה לפני ארוחה, עדיף בבוקר.
אין ללעוס את תכולת הכמוסה.
לחולים עם בעיות בליעה ניתן לפתוח את הכמוסה ולבלוע את תכולתה או לערבב את התכולה עם נוזל חומצי כגון מיץ תפוזים או יוגורט ולהשתמש תוך 30 דקות. כמו כן ניתן למצוץ את הכמוסה ולבלוע את תכולתה.
יש לערבב לפני כל שתייה על מנת לוודא נטילת כל התרופה ולהוריד את שאריות התרופה שבכוס ע"י שטיפת הכוס עם חצי כוס מים ושתייתם.

מנעי הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבאי/י אריות התרופה איתך.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא !
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכבי/י משקפיים אם הינך קוקה/ה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו במקום קריר.
ניתן להשתמש בתכשיר 3 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק.
גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר ! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 139 78 31879 00

מיוצר ע"י טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ת"ד 3190, פתח-תקוה

עבור אביק בע"מ

ת"ד 8077, קרית ספיר נתניה.