

אימודיום® כמוסות

הרכב: כל כמוסה מכילה: Loperamide 2mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Lactose, starch, talc and magnesium stearate, Hard Gelatin capsule

פעילות רפואית:

התרופה מיועדת לטיפול בשלשול חריף

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אל תשתמשי בתכשיר כאשר הינך מניקה
אין להשתמש בתכשיר בילדים מתחת לגיל ארבע.
אין להשתמש בתכשיר אם יש דם בצואה או אם יש לך חום גבוה.
אין להשתמש בתכשיר אם אתה צריך להמנע מהאטת פעילות המעיין, לדוגמא, אם אתה סובל מעצירות או אם מבטן נפוחה.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

אם הינך בהריון.

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הכבד.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך ?

לעיתים טיפול בשלשולים עם אימודיום עלול לגרום לעייפות, סחרחורת או נמנום, על כן יש להזהר בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אזהרות:

אימודיום בדרך כלל יעצור את השלשול תוך 24 שעות. במידה והשלשולים לא נפסקו, יש להפסיק

לקחת את התרופה ולפנות לרופא.

בחולי איידס הנוטלים אימודיום, במקרה של סימן להתנפחות או בליטה בבטן, יש להפסיק את

השימוש בתרופה ולדווח לרופא מיד.

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך דווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. במיוחד, לגבי תרופות המאיטות את קצב תנועת הקיבה או המעי (תרופות אנטיכולינרגיות).

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון:

יובש בפה, בחילה והקאות, נמנום, עייפות, סחרחורת, כאבי בטן, תחושת אי נוחות, נפיחות וגזים במערכת

העיכול. תופעות אלו עלולות להיגרם גם מהשלשולים.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת :

עצירות, נפיחות בבטן וקושי בהטלת שתן: הפסק/י הטיפול. אם תופעות אלו חמורות פנה/י לרופא.
רגישות יתר לתכשיר נדירה והיא מתבטאת בפריחה בעור, גירוד, קשיי נשימה או נפיחות בפנים.
באם הינך, חשה/ה באחת מתופעות אלו פנה/י לרופא.
תופעות לוואי בעקבות מינון יתר: נוקשות שרירים, חוסר תיאום בתנועות הגוף, נמנום, קושי במתן שתן, קושי בנשימה או נשימה חלשה.
בכל מקרה שבו הינך מרגישה/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת הרופא:

מבוגרים: 2 כמוסות בהתחלה ולאחר מכן כמוסה אחת לאחר כל יציאה נוזלית. אין ליטול יותר מ 8 כמוסות ביממה.

אין לעבור על המנה המומלצת

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת 4 שנים.
שימוש בתרופה בילדים בגיל 4-12 שנים מחייב מרשם רופא ופיקוח רפואי.
ילדים מעל גיל 5: כמוסה אחת בהתחלה ולאחר מכן כמוסה אחת לאחר כל יציאה נוזלית. אין ליטול יותר מ- 8 כמוסות ביממה.

משקל הילד בק"ג	מספר כמוסות מקסימלי ליום
20 ק"ג	לא יותר מ 3 כמוסות ליום
27 ק"ג	לא יותר מ 4 כמוסות ליום
34 ק"ג	לא יותר מ 5 כמוסות ליום
40 ק"ג	לא יותר מ 6 כמוסות ליום
47 ק"ג	לא יותר מ 7 כמוסות ליום
54 ק"ג	לא יותר מ 8 כמוסות ליום

במידה והשלשול נמשך יותר מ-24 שעות או שמתפתח חום, יש לפנות לרופא
אם יש לך צואה קשה או אם לא היתה לך יציאה במשך 24, שעות יש להפסיק לקחת אימודיום.

אופן השימוש:

אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מים.
אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול

תכשיר זה עוזר את השלשול אולם אינו מטפל בסיבות הגורמות לו. יש לטפל גם בסיבות לשלשול בכל מקרה שהדבר אפשרי.

שלשול גורם לאבדן נוזלים מוגבר. יש לשתות הרבה על מנת להחזיר לעצמך את הנוזלים ולמנוע התייבשות. דבר זה חיוני במיוחד אצל ילדים קטנים. הרוקח יוכל לספק לך אבקה המכילה סוכר ומלחים אשר בתוספת מים משמשת להחזרת המלחים שאת/ה מאבד/ת עקב השלשול.

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי- כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון לבית-חולים והבא אריזת

התרופה אתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא !
תרופה זו נרשמה לך, לטיפול במחלתך. באנשים אחרים עלולה להזיק. אל תתן תרופה זו לקרוביך, שכניך
או מכריך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק
להם.

אחסנה:

בטמפ' החדר, 15-30°C .
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר ! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את
התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 251020676

יצרן: ינסן סילג, ואל דה רואי, צרפת.

בעל הרישום: ג"י סי' הלת'קר בע"מ, קיבוץ שפיים 60990 ישראל.

יבואן: סלומון, לוין ואלשטיין בע"מ, התרופה 12, ת.ד. 8077, נתניה 42504.