

עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו

שם התכשיר: אגיסטון V טבליות ואגינוליות (לשימוש תוך-נרתיקי)

הרכב:

כל טבליה מכילה Clotrimazole 0.2g

חומרים בלתי פעילים:

Calcium lactate, Maize starch, Crospovidone, Highly dispersed silicon dioxide,
Lactic acid, Lactose 200, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose,
Microcrystalline cellulose.

קבוצה תרפויטית: אנטי-פטרייתית.

פעילות רפואית:

תרופה אנטי-פטרייתית רחבת טווח לטיפול מקומי בזיהומים פטרייתיים (כגון קנדידה) בנרתיק, המאופיינים
ע"י גרד נרתיקי, עקצוצים, צריבה, המלווים לעיתים בהפרשה מוגברת.

מתי אין להשתמש בתרופה?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לחומרים אנטי-פטרייתיים אחרים מאותה
משפחה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך בהריון או מניקה.

אזהרות:

אם הינך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
במידה שזו הפעם הראשונה שהינך סובלת מזיהום בנרתיק, התייעצי עם רופא. אם רופא איבחן אצלך בעבר
זיהום פטרייתי והינך סובלת מתופעות דומות, השתמשי באגיסטון V במשך 3 ימים.
אין להשתמש בתרופה אם הינך סובלת מכאבי בטן תחתונה ומחום.
אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים, עליך להתייעץ עם רופא.
אם התופעות חוזרות תוך חודשיים מתום הטיפול, עליך להתייעץ עם רופא. יתכן שהינך בהריון או שהבסיס
לתופעות הוא מצב רפואי אחר כגון סוכרת, המחייב התייעצות עם רופא.
אין להשתמש בתרופה בזמן הוסת או דימום נרתיקי.
הטיפול צריך להסתיים לפני תחילת הוסת.
בזמן הטיפול בתרופה יש להימנע מקיום יחסי מין, במיוחד כשמשמשים באמצעי מניעה (כגון: קונדום,
דיאפרגמה) שעשויים מלטקס (Latex)-גומי טבעי, משום שיעילות אמצעי מניעה אלו יורדת בזמן השימוש
עם אגיסטון V.
אין להשתמש בתרופה מתחת לגיל 12.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטלת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי
למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

צריבה, כאבים, פריחה או גירוי מקומי, שהופיעו לאחר התחלת הטיפול (נדיר); הפסיקי את הטיפול לפני
לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגישה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך
להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:
טבליה אחת בערב לפני השינה, במשך 3 ערבים רצופים (ראי סעיף "אופן השימוש").
אין לעבור על המנה המומלצת.
אם שכחת להשתמש בתרופה זו בזמן קצוב יש להשתמש במנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן אין להשתמש בשתי מנות ביחד!

שימי לב:
לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש נרתיקי בלבד.

אופן השימוש:
יש להחדיר את הטבליה בעזרת מתקן ההחדרה המצורף, עמוק ככל האפשר לתוך הנרתיק, בערב לפני השינה. הדרך הטובה ביותר לבצע זאת היא בשכיבה על הגב עם הברכיים כפופות קצת פנימה לעבר הגוף (ראי איור 2). יש לשטוף היטב את מתקן ההחדרה לאחר כל שימוש. במידה שהאזור החיצוני של איבר המין גם מגורה ו/או אדמומי, יש למרוח אגיסטן קרם. כדי למנוע הדבקה חוזרת ע"י בן הזוג, רצוי שגם בן הזוג ישתמש באגיסטן קרם באזור איבר המין.

כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול?
עליך להשלים את הטיפול בהתאם להוראות.
כדי שהטבליה תבוא במגע עם לחות וע"י כך תימס לחלוטין, חשוב מאוד להחדירה עמוק ככל האפשר לנרתיק.
לבשי רק לבנים מכותנה והחליפי לעיתים קרובות. גם גרביונים יש להחליף מדי יום.
אין להשתמש בתכשיר לשטיפת הנרתיק בזמן הטיפול באגיסטן V.
בעת השימוש בתרופה לנרתיק תיתכן הכתמה של הלבנים. כדי למנוע הכתמה ניתן להשתמש בתחבושת היגיינית או במגן תחתון.

מנעי הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנעי הרעלה.
אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פני מיד לחדר מיון של בית-חולים והביאי אריזת התרופה איתך.
אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אל תיתני תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.
אין ליטול תרופות בחושך! בדקי התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה.
הרכיבי משקפיים אם הינך זקוקה להם.

אחסנה:
במקום קריר. לא להקפיא.
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 2613.25080

היצרן: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ, ירוחם.

1.12.05