

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

1. שם התכשיר וצורתו: **קרטיה™** טבליות בציפוי אנטרי

2. הרכב: החומר(ים) הפעיל(ים) וכמותם/ריכוזם:

כל טבליה בציפוי אנטרי מכילה:

**Acetyl Salicylic Acid 100 mg**

חומרים בלתי פעילים:

Cellacephate ( cellulose acetate phthalate),Guar Gum, Diethyl Phthalate, Opaspray N-1-2564,Carnauba Wax, Dichlormethane, Denatured Absolute Alcohol F3.

קבוצה תרפויטית: נוגדי דלקת לא סטרואידים.

3. פעילות רפואית:

עיכוב הצמתת טסיות דם ( לפי הוראות רופא ).

4. התוויה:

התרופה מיועדת למניעה ראשונית של מחלת לב כלילית בחולים בסיכון גבוה (של 5% ל-5 שנים) ולמניעה שניונית של מחלות הלב והמוח הנגרמות מפקקת עורקים.

5. מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות מאותה קבוצה, כגון: אספירין.  
אין להשתמש בתרופה זו בחולים הסובלים מכיב קיבה ומדימומים או מאסטמה בשילוב עם פוליפים באף.  
אין להשתמש בתרופה זו בילדים ומתבגרים עד גיל 20 במחלות המלוות בחום, דוגמת שפעת, אבעבועות רוח (מחשש לתסמונת ריי).

6. אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון, מיניקה. לא מומלץ ליטול חומצה אצטיל סליצילית במינון גבוה בשליש האחרון של ההריון.  
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד:  
מערכת הנשימה (כגון אסטמה)  
הלב ו/או כלי הדם  
הכליה/מערכת השתן  
הכבד  
מערכת העיכול (כגון אולקוס)  
מערכת הדם (כגון קרישה וכו')  
פוליפים באף  
יתר לחץ דם

7. איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

אין לשתות יינות בירה או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה

## 8. אזהרות:

אין להשתמש בתרופה בילדים ובמתבגרים ללא התייעצות עם רופא. יש להפסיק ליטול תרופה זו לפחות חמישה ימים לפני כל ניתוח, כולל ניתוח דנטלי, אלא אם קיימת הוראה אחרת מרופא. בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו, או במינונים גבוהים, יש לערוך בדיקות דם, תפקודי כבד וכליה. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אין לשתות יינות, בירה או משקאות אלכוהוליים אחרים בתקופת הטיפול בתרופה, שכן חומצה אצטיל סליצילית עלולה לגרום לדימומים בקיבה.

## 9. תגובות בין-תרופתיות:

אם הנך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:

- תרופות נגד קרישת דם
- תרופות נגד בחילה מקבוצת הפנותיאזינים
- תרופות נגד סוכרת
- חומצה אסקורבית (ויטמין C)
- סטרואידים
- מטורקסאט
- תרופות לאפילפסיה כגון חומצה ואלפרואית, פניטואין
- תכשירים אנטיביוטיים
- תרופות לטיפול בשיגדון (פרובנציד, סולפינפירזון, פנילבוטזון)
- תרופות לטיפול בגלאוקומה (אצטזולאמיד)
- תרופות נוספות בעלות פעילות משככת כאבים,
- תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים ותרופות נוספות בעלות פעילות משככת כאבים
- תרופות לטיפול במחלת הכשל החיסוני (זידודין)
- תרופות המשנות את חומציות השתן (כגון מינון גבוה של סותרני חומצה)
- תרופות לטיפול בכיב קיבה כגון סותרני חומצה וחוסמי קולטנים להיסטמין.

## 10. תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון:

- בחילות והקאות, כאבי בטן קלים, צרבת

תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר. אולם אם הן מתמשכות או מטרידות, היוועץ/י ברופא.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

- בחילה, סחרחורת, חולשה, נדיר: הפסק הטיפול ופנה/י לרופא
- שינוי בשמיעה (במינון יתר), נדיר: הפסק הטיפול ופנה/י לרופא
- פריחה בעור או גירויים, נדיר: הפסק הטיפול ופנה/י לרופא
- קשיים בנשימה, נפחות באזור הפנים, נדיר: הפסק הטיפול ופנה/י לרופא
- יצירת יתר של רירית הקיבה, נדיר: הפסק הטיפול ופנה/י לרופא
- צואה דמית או שחורה, נדיר: הפסק הטיפול ופנה/י לרופא
- כאבי בטן חזקים, נדיר: הפסק הטיפול ופנה/י לרופא

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

## 11. תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

## 12. מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

**מבוגרים:** טבליה אחת ליום. אין לעבור על המנה המומלצת.  
תרופה זו למניעת הצממת טסיות דם ניטלת על פי הוראות הרופא.  
**תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים ומתבגרים עד גיל 20.**  
יש ליטול תרופה זו במרווחי זמן מסוימים, כפי שנקבע ע"י הרופא.  
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשזכרת: אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

### 13. אופן השימוש:

אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה פעם ביום עם כוס מלאה של מים.  
אין ללעוס או לשבור את הטבליה כיוון שהתרופה בעלת ציפוי אנטרי (מגן). יש לחכות פרק זמן של שתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סותרי חומצה נגד צרבת.  
**אם את/ה סובל/ת ממעיים עצבניים:** יש ליטול את התרופה הזו עם או מיד בתום הארוחה.  
אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה.

### 14.

**כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?**

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

### 15. מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא ההוראה מפורשת מרופא!

16. אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

### 17. אחסנה:

במקום קריר

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.  
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

050.89.26384.00

**מס' רישום התרופה:**

כתובת: אוסטרליה

**יצרן:** סיגמה פרמציוטיקלס PTY בע"מ

כתובת: רח' בזל 25, פ"ת

**בעל רישום:** גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ