

ZYLLERGY - Caplets

Patient package insert according to Pharmaceuticals' Regulations (Preparations), 1986.

Carefully read the entire package insert before using this medicine.

Composition:

Each caplet contains:
Cetirizine dihydrochloride 10 mg
Inactive ingredients:
Lactose, maize starch, starch pregelatinised, povidone, talc, eudragit E, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 6000.

Therapeutic action:

Zyllergy belongs to the anti-histamine group of drugs. Zyllergy is intended for the treatment of symptoms of seasonal allergic rhinitis (hay fever) or perennial allergic rhinitis. Symptoms include sneezing, runny nose, nasal or ocular itching, tearing, and treatment of chronic urticaria manifested by skin irritation (e.g. itching, rash).

When should this medicine not be used?

Do not use this medicine if you are breastfeeding.
Do not use this medicine if you are aware of any hypersensitivity to it or any of its ingredients or hydroxyzine.
Do not use this medicine if you are suffering or have suffered in the past from impaired function of the kidney/urinary tract, from heart rate disturbances.

Do not use this medicine without consulting your physician before commencing treatment:

If you are pregnant or if you suffer, or have suffered in the past, from impaired function of: the respiratory system (e.g. asthma), the heart and/or vascular system, the liver, the kidney/urinary tract or the prostate gland, or if you are suffering from glaucoma - a type of eye impairment, or from an intestinal obstruction.

How will this medicine influence your daily schedule?

Do not drink wine or other alcoholic beverages during the period of treatment with this medicine.
Inform the physician that you are under treatment with Zyllergy before undergoing allergy tests, because this medicine can affect the test results.

Warnings:

Do not use this medicine frequently or for prolonged periods without consulting your physician.
If you are aware of any sensitivities to foods or drugs, especially antihistamines, inform your physician before taking this medicine.

Drug interactions:

If you are taking other medicines concurrently, or have just completed treatment with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards or inefficacy arising from drug interactions, especially in regard to: preparations containing alcohol; acetyl salicylic acid (aspirin); drugs affecting the central nervous system such as sedatives, sleeping pills, drugs for treating epilepsy, anticonvulsants or muscle relaxants, barbiturates, antiarrhythmics, surgical anaesthetics (including for dental surgery), analgesic or narcotic substances; theophylline.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, some side effects may appear during treatment, such as: dryness of the mouth, nausea, vomiting.

See next page

ЗИЛПЕРЖИ - Каплеты

Инструкция для потребителей в соответствии с Фармацевтическими стандартами (Препараты), 1986.

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приемом препарата.

Состав:

Каждая каплетка содержит:
Cetirizine dihydrochloride 10 mg
Вспомогательные вещества:
Lactose, maize starch, starch pregelatinised, povidone, talc, eudragit E, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 6000.

Показания к применению:

Препарат Зилпержи принадлежит к группе антигистаминных препаратов. Препарат Зилпержи показан для купирования симптомов сезонного аллергического ринита (поллиноза) или круглогодичного аллергического ринита (средних симптомов): чихание, насморк, зуд в носу или глазах, слезотечение и хронической крапивницы, проявляющейся раздражением кожи (например, зуд, сыпь).

Противопоказания к применению:

Противопоказано применение препарата в период кормления грудью.
Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности к препарату, одному из его компонентов или к препарату гидроxyzин (hydroxyzine).
Противопоказано применение препарата, если Вы страдаете или страдаете нарушением функций почечной/почечекислородного тракта, нарушениями сердечного ритма.

Не применяйте препарат без предварительной консультации врача:

Если Вы беременны, если Вы страдаете или страдаете в прошлом нарушениями функций дыхательной системы (например, астмой), сердечно-сосудистой системы, печени, почечной/почечекислородного тракта или предстательной железой, если Вы страдаете глаукомой (заболевание глаз) или непроходимостью кишечника.

Внимание! Препарат на повседневную жизнь:

Не употребляйте вино или другие алкогольные напитки в период лечения данным препаратом.
Сообщите врачу о приеме препарата Зилпержи, если Вам предстоит прохождение аллергических тестов, поскольку прием этого препарата может повлиять на их результаты.

Предостережения:

Не применяйте препарат часто или длительно без консультации врача.
До начала приема препарата следует сообщить врачу о наличии у Вас повышенной чувствительности к какому-либо продуктам питания или лекарственным препаратам, в особенности, к антигистаминным препаратам.

Взаимодействие препаратов:

Если Вы принимаете другой лекарственный препарат или только что закончили лечение другим препаратом, сообщите об этом лечащему врачу в целях предотвращения опасности или неэффективности лечения, связанных со взаимодействием препаратов, в особенности, если Вы принимаете препараты следующих групп: препараты, содержащие алкоголь; ацетилсалициловую кислоту (аспирин); препараты, воздействующие на центральную нервную систему, например, седативные, снотворные, для лечения эпилепсии, антиконвульсанты или мышечные релаксанты, барбитураты, препараты для лечения аллергии, хирургические анестетики (включая применяемые в стоматологии), болеутоляющие препараты или наркотические вещества; теофиллин.

Побочные эффекты:

Во время курса лечения, наряду с желаемым действием препарата, могут возникнуть побочные эффекты, такие как: сухость во рту, тошнота, рвота, понос, диспепсия, возбуждение.

Продолжение на обороте

Зилерджи - Каплет

Тщательно читайте инструкцию перед приемом препарата.

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приемом препарата.

Состав:

Каждая каплетка содержит:
Cetirizine dihydrochloride 10 mg
Вспомогательные вещества:
Lactose, maize starch, starch pregelatinised, povidone, talc, eudragit E, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 6000.

Показания к применению:

Препарат Зилерджи принадлежит к группе антигистаминных препаратов. Препарат Зилерджи показан для купирования симптомов сезонного аллергического ринита (поллиноза) или круглогодичного аллергического ринита (средних симптомов): чихание, насморк, зуд в носу или глазах, слезотечение и хронической крапивницы, проявляющейся раздражением кожи (например, зуд, сыпь).

Противопоказания к применению:

Противопоказано применение препарата в период кормления грудью.
Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности к препарату, одному из его компонентов или к препарату гидроxyzин (hydroxyzine).
Противопоказано применение препарата, если Вы страдаете или страдаете нарушением функций почечной/почечекислородного тракта, нарушениями сердечного ритма.

Не применяйте препарат без предварительной консультации врача:

Если Вы беременны, если Вы страдаете или страдаете в прошлом нарушениями функций дыхательной системы (например, астмой), сердечно-сосудистой системы, печени, почечной/почечекислородного тракта или предстательной железой, если Вы страдаете глаукомой (заболевание глаз) или непроходимостью кишечника.

Внимание! Препарат на повседневную жизнь:

Не употребляйте вино или другие алкогольные напитки в период лечения данным препаратом.
Сообщите врачу о приеме препарата Зилерджи, если Вам предстоит прохождение аллергических тестов, поскольку прием этого препарата может повлиять на их результаты.

Предостережения:

Не применяйте препарат часто или длительно без консультации врача.
До начала приема препарата следует сообщить врачу о наличии у Вас повышенной чувствительности к какому-либо продуктам питания или лекарственным препаратам, в особенности, к антигистаминным препаратам.

Взаимодействие препаратов:

Если Вы принимаете другой лекарственный препарат или только что закончили лечение другим препаратом, сообщите об этом лечащему врачу в целях предотвращения опасности или неэффективности лечения, связанных со взаимодействием препаратов, в особенности, если Вы принимаете препараты следующих групп: препараты, содержащие алкоголь; ацетилсалициловую кислоту (аспирин); препараты, воздействующие на центральную нервную систему, например, седативные, снотворные, для лечения эпилепсии, антиконвульсанты или мышечные релаксанты, барбитураты, препараты для лечения аллергии, хирургические анестетики (включая применяемые в стоматологии), болеутоляющие препараты или наркотические вещества; теофиллин.

Побочные эффекты:

Во время курса лечения, наряду с желаемым действием препарата, могут возникнуть побочные эффекты, такие как: сухость во рту, тошнота, рвота, понос, диспепсия, возбуждение.

Продолжение на обороте

Зилерджи - Каплет

Тщательно читайте инструкцию перед приемом препарата.

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приемом препарата.

Состав:

Каждая каплетка содержит:
Cetirizine dihydrochloride 10 mg
Вспомогательные вещества:
Lactose, maize starch, starch pregelatinised, povidone, talc, eudragit E, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 6000.

Показания к применению:

Препарат Зилерджи принадлежит к группе антигистаминных препаратов. Препарат Зилерджи показан для купирования симптомов сезонного аллергического ринита (поллиноза) или круглогодичного аллергического ринита (средних симптомов): чихание, насморк, зуд в носу или глазах, слезотечение и хронической крапивницы, проявляющейся раздражением кожи (например, зуд, сыпь).

Противопоказания к применению:

Противопоказано применение препарата в период кормления грудью.
Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности к препарату, одному из его компонентов или к препарату гидроxyzин (hydroxyzine).
Противопоказано применение препарата, если Вы страдаете или страдаете нарушением функций почечной/почечекислородного тракта, нарушениями сердечного ритма.

Не применяйте препарат без предварительной консультации врача:

Если Вы беременны, если Вы страдаете или страдаете в прошлом нарушениями функций дыхательной системы (например, астмой), сердечно-сосудистой системы, печени, почечной/почечекислородного тракта или предстательной железой, если Вы страдаете глаукомой (заболевание глаз) или непроходимостью кишечника.

Внимание! Препарат на повседневную жизнь:

Не употребляйте вино или другие алкогольные напитки в период лечения данным препаратом.
Сообщите врачу о приеме препарата Зилерджи, если Вам предстоит прохождение аллергических тестов, поскольку прием этого препарата может повлиять на их результаты.

Предостережения:

Не применяйте препарат часто или длительно без консультации врача.
До начала приема препарата следует сообщить врачу о наличии у Вас повышенной чувствительности к какому-либо продуктам питания или лекарственным препаратам, в особенности, к антигистаминным препаратам.

Взаимодействие препаратов:

Если Вы принимаете другой лекарственный препарат или только что закончили лечение другим препаратом, сообщите об этом лечащему врачу в целях предотвращения опасности или неэффективности лечения, связанных со взаимодействием препаратов, в особенности, если Вы принимаете препараты следующих групп: препараты, содержащие алкоголь; ацетилсалициловую кислоту (аспирин); препараты, воздействующие на центральную нервную систему, например, седативные, снотворные, для лечения эпилепсии, антиконвульсанты или мышечные релаксанты, барбитураты, препараты для лечения аллергии, хирургические анестетики (включая применяемые в стоматологии), болеутоляющие препараты или наркотические вещества; теофиллин.

Побочные эффекты:

Во время курса лечения, наряду с желаемым действием препарата, могут возникнуть побочные эффекты, такие как: сухость во рту, тошнота, рвота, понос, диспепсия, возбуждение.

Продолжение на обороте



