

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידי

אספירין סיבליות תוססות

הרכב:
כל טבליה מכילה:
Acetylsalicylic Acid (Aspirin) 400 mg
Ascorbic Acid (Vitamin C) 240 mg

הטבליות מכילות גם:
Monosodium Citrate, Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate, Citric Acid

(תכולת נתרן: 467 מ"ג)

פעילות רפואית:

לשיכוך כאבים, הורדת חום, טיפול בתהליכים דלקתיים לא זיהומיים (אנטי-ראומטיים), עיכוב הצמנת ססיות דם.
טפילם במחלות ראומיות ומניעת הצמנת ססיות דם, רק לפי הוראות הרופא.)

מתי אין להשתמש בתרופה?

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות מאותה משפחה.
אם להשתמש בתרופה זו בחולים הסובלים מכיב קיבה ומדימומים או מאסטמה בשילוב עם פוליופים באף.
אם להשתמש בתרופה זו בילדים ובמתגרים עד גיל 20 במחלות המלוות בחום דוגמת שפעת, אבעבועות רוח (מתוך חשש להסמנות ריז).

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון או מיניקה.
לא מומלץ ליטול אספירין או תרופות בשליש האחרון של ההריון.
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הלב ו/או כלי הדם, הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול, מערכת הדם, פוליופים באף.
אם הינך סובל/ת מבצקות או מיתר לחץ דם.

אם הינך שומר/ת על דיאטה דלת נתרן.
אם הינך רגישה/ה לתרופות נגודות דלקת או לתרופות אנטי-ראומטיות.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

רצוי להמעיט בצריכת אלכוהול בתקופת הטיפול עם התרופה.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה בילדים ובמתגרים ללא התייעצות עם רופא.
אין ליטול תרופה זו 5 ימים לפני כל ניתוח, כולל ניתוח דנטלי, אלא אם קיימת הוראה אחרת מרופא.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה העולה על 10 ימים ברציפות בלי להיוועץ ברופא.

אם הינך רגישה/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

שימוש במונחים גבוהים של התרופה עלול להשפיע על בדיקות מעבדה של רמת הגלוקוז בשתן.

בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו או בטיפול במונחים גבוהים, יש לערוך בדיקות דם, תפקודי כבד וכליה.

אם הינך צורך/ת 3 או יותר משקאות אלכוהוליים ביום, יש להיוועץ ברופא אם ליטול תכשיר זה, או להשתמש בתכשיר אחר לשיכוך כאבים ו/או להורדת חום.
שכן אספירין עלול לגרום לדימומים בקיבה.
אין ליטול בו זמנית עם תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקות שאינם סטרואידים.

תגובות בין-תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד בחילה, תרופות נגד קרישת דם, תרופות נגד סוכרת, סטרואידים, תרופות לטיפול בשיגדון (פרובנצייד, סולפינפירזון, פנילבוטזון), תרופה לטיפול בגלאוקומה (אצטזולאמיד), תרופה לטיפול באיפילפסיה (חומצה ולפראית), תרופות נוספות בעלות פעילות משככת כאבים, תרופות מקבוצות הפנותיאזינים, זידובודין (תרופה לטיפול במחלת הכשל החיסוני), תרופות המשנות את ה- pH

של השתן (כגון מינון גבוה של סותרי חומצה), מטוסטרקוסט, תרופה נוספת המכילה חומצה אסקורבית (ויטמין C), סולפונאמידים, אלדוסטרון, דיגוקסין, תרופות נגד יתר לחץ דם.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: בחילות והקאות, כאבי בטן קלים, צרבת. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתרופה, אולם אם הן מתמשכות או מטרידות היוועץ/י ברופא.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

סחרחורת, חולשה, פריחה או גירויים בעור, שינוי בשמיעה (במינון יתר), קשיים בנשימה, נפיחות באזור הפנים, יצירת יתר של רירית הקיבה, צואה דמית או שחורה וכאבי בטן חזקים (נדיר): הפסקו את הטיפול ופנה/י לרופא.

לעיתים נדירות עלולים להתפתח כיבים במערכת העיכול, אשר בנסיבות מסוימות מלווים בשטפי דם וניקוב דופן המעי. אובדן כמויות מעטות של דם במערכת העיכול, שעלול להוביל במקרים יוצאי דופן לאנמיה. נצפו מקרים מבודדים של הפרעות בתפקודי כבד וכליות, תת-סוכר בדם ותגובות אלרגיות חריפות בעור.

בכל מקרה שבו הינך מרגישה/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע השתן או הצואה. בשינויים אלה אין מקום לדאגה.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה (ראה/י לעיל אזהרות מיוחדות שפורטו.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

לשיכוך כאבים ולהורדת חום:

מבוגרים:

1-2 טבליות עד 4 פעמים ביממה.

ילדים: בהתייעצות הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או

הכאבים נמשכים יותר מ-10 ימים, יש לפנות לרופא.

טיפול במחלות ראומטיות ומניעת

הצמנת ססיות דם:

לפי הוראות הרופא.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אופן השימוש: אין ללעוס! אין לבלוע! יש ליטול התרופה עם או אחרי הארוחה. שימי/י את הטבליה/יות בכוס והוספי/י מים או נוזל אחר.

בדוק/י האם כל הטבליה התמוססה ושתה/י את כל הכמות.

ניתן לשותות בזמן התסיסה או אחריה. על-מנת להבטיח שנטלת את כל המנה הדרושה, הוספי/י לכוס כמות נוספת של מים ושתה/י.

אין לשכב ב- 15-30 הדקות שלאחר נטילת התרופה.

איכיד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?
אין להפסיק את הטיפול בתרופה הנלקחת בהוראות הרופא לצורך מניעת הצמנת ססיות הדם או לטיפול במחלות ראומטיות, ללא התייעצות עימו.

מנעו/י הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנעו/י הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לאחד מייון של בית-חולים והבא/י אריות התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוית והמנה **בכל פעם** שיהיך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום קריר ויבש.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות שמרנות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שגונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 5786.24955

יצרן: באייר א.ג., גרמניה.

בעל הרישום: דיפריס ושות' בע"מ, ת.ד. 53463 ת"א 61533.

נشرة טיבית למستهלק بموجب انظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورحص من قبلها

أسپیرین سي

أقراص فوارة

التريكب:

كل قرص يحتوي:

Acetylsalicylic Acid (Aspirin) 400 mg
Ascorbic Acid (Vitamin C) 240 mg

تحتوي الأقراص أيضاً:

Monosodium Citrate, Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate, Citric Acid.

(كمية الصوديوم: ٤٦٧ ملغ)

تأثيرات الدواء الطيبة:

مسكن للألام، مخفض للحرارة، معالجة مراحل النهائية غير ملوثة (مضاد للروماتيزم)، إعاقاة تكسد الصفائح الدموية (معالجة أمراض الروماتيزم ومنع تكسد الصفائح الدموية، يجب أن تتم بتعليمات من الطبيب فقط).

مقی لا یجوز لك استعمال الدواء؟

لا یجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته أو لأدوية أخرى من نفس الفصيلة.

لا یجوز استعمال هذا المستحضر لدى مرضی يعانون من قرحة معدية ومن نزف دموي أو من الربو المتراقف مع زوائد أنفیهة.

لا یجوز استعمال الدواء لدى الأطفال والمراهقين حتى سن ٢٠ وذلك في معالجة أمراض ترافقها سخونة كالإنفلونزا، جدری الماء (خشية ظاهرة ريبی).

لا یجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدما:

عندما تكونین في فترة الحمل أو الرضاعة.
لا یوصی باستعمال الأسپیرین بجرعات عالية في الثلث الأخير من الحمل.
اذا كنت تعانين/ن أو اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: الجهاز التنفسي (كأربو)، القلب و/أو الأوعية الدموية، الكبد، الكلى/المسالك البولية، الجهاز الهضمي، جهاز الدم، زوائد أنفیهة.
اذا كنت تعانين/ن من ودمات أو من ضغط الدم العالي.

اذا كنت تتبع/ين حمية فقيرة بالصوديوم.
إذا وجدت لديك حساسية للأدوية المضادة للالتهاب أو للأدوية المضادة للروماتيزم.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية؟

من المرغوب به الإقلال من شرب المشروبات الكحولية أثناء فترة تناول هذا الدواء.

تحذيرات:

لا یجوز استعمال الدواء لدى الأطفال والمراهقين بدون استشارة الطبيب.

لا یجوز استعمال هذا الدواء ٥ أيام قبل إجراء أي عملية جراحية بما في ذلك جراحة الاسنان، إلا إذا كانت هناك تعليمات أخرى من الطبيب.

لا یجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة تزيد عن ١٠ أيام بشكل متواصل بدون استشارة الطبيب.

يجب البلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

إن استعمال هذا الدواء بجرعات عالية قد يؤثر على الفحوص المخبرية لنسبة الجلوكوز في البول.

يجب إجراء الفحوص الطبية للدم ووظائف الكبد والكليه أثناء فترة تناول هذا الدواء وذلك اذا استمر العلاج لفترة طويلة أو اذا عولجت بجرعات عالية.

اذا كنت تشرب/ين ٣ مشروبات كحولية أو أكثر في اليوم، فيجب استشارة الطبيب بشأن تناول هذا الدواء أو استعمال مستحضر آخر لتسكين الألام و/أو لتخفيف السخونة.
نظراً لأن الأسپیرین قد يسبب نزيفاً في المعدة.

لا یجوز تناول هذا الدواء بشكل متزامن مع أدوية أخرى من فصيلة مضادات الإلتهاب الالاستيروئيدية.

التفاعلات بين الأدوية:

اذا كنت تتعاطين/ن دواءً اضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتمي الى المجموعات التالية: مضادات الغثيان، مضادات تخثر الدم، مضادات السكري، الستيروئيدات، الأدوية التي تعالج النقرس (پروبنسید، سولفينپیرازون، فینیلپوتازون)،

الأدوية التي تعالج الجلوکوما (اسيتازولامید)، الأدوية التي تعالج الصرع (حمض فالپروتیک)، الأدوية الأخری ذات التأثير المسکن للألام، عقاقير من فصيلة الفینوتيازينات، زيدوفودین (دواء لمعالجة مرض فشل المناعة المكتسبة)، العقاقير التي تغير حموضة البول (كتناول جرعات عالية من مضادات الحموضة)، ميتوترانسات، عقاقير أخرى تحتوي حمض الأسكوريك (فيتامين

ASPI C ETAB PL SH 180906

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved

ASPIRIN C

Effervescent tablets

Composition:

Each tablet contains:
Acetylsalicylic Acid (Aspirin) 400 mg
Ascorbic Acid (Vitamin C) 240 mg

The tablets also contain:

Monosodium Citrate, Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate, Citric Acid.
(Sodium content: 467 mg).

Therapeutic activity:

For relief of pain, reduction of fever (antipyretic), treatment of non-infective inflammatory processes (antirheumatic), inhibition of platelet aggregation (treatment of rheumatic diseases and prevention of platelet aggregation according to doctor's instructions only).

When should the medicine not be used?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients or to other drugs from the same family. Do not use this medicine in patients suffering from gastric ulcer and bleeding, or from asthma in combination with nasal polyps.

Do not use this medicine in children or adolescents up to the age of 20 in diseases accompanied by fever, such as flu or chicken pox (due to the risk of Reye's syndrome).

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:

If you are pregnant or breastfeeding. Aspirin in high dosages is not recommended in the last trimester of pregnancy. If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of the respiratory system (e.g. asthma), the heart and/or vascular system, the liver, the kidney/urinary tract, the gastrointestinal

tract, the blood system, nasal polyps. If you suffer from oedemas or hypertension. If you are maintaining a low sodium diet. If you are sensitive to anti-inflammatory or anti-rheumatic drugs.

How will this medicine affect your daily life?

Alcohol consumption should be minimised while under treatment with this medicine.

Warnings:

Do not use this medicine in children or adolescents without consulting your doctor. Do not take this medicine 5 days before any surgery, including dental surgery, unless otherwise instructed by your doctor. Do not use this medicine frequently or for a period exceeding 10 consecutive days without consulting your doctor.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine. High dosages of this medicine may affect the results of laboratory tests for urine glucose levels.

During periods of prolonged treatment or when this medicine is taken in high dosages, blood tests, liver and kidney function tests should be performed.

If you consume 3 or more alcoholic drinks every day, consult a doctor whether you should take this medicine, or another product for the relief of pain and/or reduction of fever. Aspirin may cause bleeding in the stomach.

Do not take concomitantly with other non steroidal anti-inflammatory drugs.

Drug interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines belonging to the following groups: antinausea drugs, anticoagulants, drugs to treat diabetes, steroids, drugs to treat gout (probenecid, sulfapyrazone, phenylbutazone), drugs to treat glaucoma (acetazolamide), drugs to treat epilepsy (valproic acid), additional analgesics, phenothiazines, drugs to treat AIDS (zidovudine), drugs which change the pH level of urine (such as high dosages of antacids), methotrexate, other drugs which also contain ascorbic acid (vitamin C),

sulfonamides, aldosterone, digoxin, anti-hypertensives.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example: nausea and vomiting, mild abdominal pain, heartburn. These side effects usually disappear within a short time following the period of adaptation to the medicine, however, if they persist or are bothersome, consult your doctor.

Side effects that require special attention: Dizziness, weakness, skin rash or irritation, change in hearing (with overdose), respiratory difficulties, swelling of the face, overproduction of gastric mucosa, bloody or black stools and severe abdominal pain (rare): stop treatment and refer to the doctor.

Gastrointestinal ulcers may rarely develop, in some circumstances with haemorrhaging and perforation. Slight blood loss from the gastrointestinal system, which may lead to anaemia in exceptional cases.

Isolated cases of liver and kidney function disturbances, hypoglycaemia and severe skin reactions have been described.

In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

This medicine may cause a change in the colour of the urine or stools. Such changes should not be a cause for worry.

Adverse reactions and drug interactions in children:

Parents must inform the attending doctor about any side effects, as well as any additional medicine being taken by the child! See special warnings described above.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by your doctor:

For relief of pain and reduction of fever:

Adults: 1-2 tablets up to 4 times daily.
Children: According to doctor's instructions only.

Do not exceed the recommended dosage. If fever persists for more than 3 days or if pain persists for more than 10 days, refer to your doctor.

Treatment of rheumatic diseases and prevention of platelet aggregation:

According to doctor's instructions.

If you forget to take this medicine at the specified time, take the dose as soon as you remember; but never take a double dose to compensate for a missed one!

Directions for use:

Do not chew! Do not swallow! Take this medicine with or after a meal. This medicine is not to be taken with or after a meal. Put the tablet in a glass and add water or another liquid. Ensure that the tablet has dissolved completely, and drink the entire amount while it is bubbling or afterwards. To make sure that you drank the entire amount, add more water to the glass and drink it. Do not lie down for 15-30 minutes after taking the medicine.

How can you contribute to the success of the treatment?

Do not discontinue treatment with this medicine without consulting your doctor if this medicine is taken according to doctor's instructions for prevention of platelet aggregation or for the treatment of rheumatic diseases.

Avoid poisoning!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:

In a cool and dry place. In case of emergency, keep in original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package.

License number: 5786.24955

Manufacturer: Bayer A.G., Germany.

License Holder:

DEVRIES & Co. Ltd., P.O.Box 53463, Tel-Aviv 61533.

إذا حدث ونسيت تناول الجرعة في الوقت المعين ثم تذكرت بذلك، فيجب تناولها حالاً! ولكن لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال.

إرشادات الاستعمال:

لا تتناول هذا الدواء مع أو بعد الطعام. ضع/ي القرص/القرص في كأس وأضف/ي الماء أو مشروب آخر. ثم اشرب/ي محتواها كلياً بعد ذوبان القرص تماماً. هذا وبالامكان شرب الكأس أثناء الفوران أو بعده ولتأمين تناول كافة الجرعة المطلوبة، أضف/ي إلى الكأس كمية إضافية من الماء واشرب/ي. لا يجوز الاستلقاء ١٥-٣٠ دقيقة بعد تناول الدواء.

كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

لا تتوقف/ي عن استعمال الدواء الذي تتناوله بتعليمات من الطبيب بغية منع تكس الصفائح الدموية أو لمعالجة الروماتيزم بدون استشارة الطبيب.

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأً من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين:

في مكان بارد وجاف. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الحزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك؛ عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٥٧٨٦-٢٤٩٥٥

المنتج: باير.ج.، ألمانيا.

صاحب الإمتياز: ديفريس وشركاؤه م.ض.، ص.ب./ ٥٣٤٦٣ تل أبيب ٦١٥٣٣

(سي)، سولفوناميدات، الستيرويدات، ديوكسين، الأدوية المضادة لضغط الدم العالي.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كالغثيان والتقيؤ، آلام خفيفة في البطن، حرقان.

تختفي هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على الدواء، أما إذا استمرت هذه الأعراض أو إذا كانت مزعجة، راجع/ي الطبيب.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

دوار، ضعف عام، طفح أو تهيج في الجلد، تغير في السمع (بجرعات عالية)، صعوبة في التنفس، انتفاخ في منطقة الوجه، إنتاج زائد لمخاطية المعدة، براز دموي أو أسود وآلام شديدة في البطن (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب. يمكن أن تتطور في أحوال نادرة قرحات في جهاز الهضم، يرافقتها في ظروف معينة نزف دموي وانتقاب جدار الأمعاء.

فقدان كميات قليلة من الدم في جهاز الهضم، يمكن أن يؤدي في حالات غير عادية إلى فقر الدم. شوهدت حوادث فردية من اضطراب في وظائف الكبد والكلى، نقص السكر في الدم وردود فعل البرجية شديدة في الجلد.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً. قد يسبب هذا الدواء تغييراً في لون البول أو البراز وأعراض كهذه لا تدعو إلى القلق.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل وعن أي دواء آخر يتناوله. راجع/ي التحذيرات الخاصة المذكورة أعلاه.

الجرعة الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

لتسكين الآلام وتخفيف السخونة:

للبنين:

قرص - قرصان حتى ٤ مرات في ٢٤ ساعة.

للأطفال:

بعد استشارة الطبيب فقط.

لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

إذا استمرت السخونة أكثر من ٣ أيام أو إذا استمرت الآلام أكثر من ١٠ أيام، يجب مراجعة الطبيب.

لمعالجة أمراض الروماتيزم ومنع تكس الصفائح الدموية:

حسب تعليمات الطبيب.