

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים

(תכשירים) התשס"ו – 1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

**גליצרין
פתילות לילדים**

הרכב:

כל פתילה מכילה:

כל פתילה מכילה:

Glycerin 2.35 gr
Stearic Acid, Sodium Carbonate

Glycerin 1.33 gr
Stearic Acid, Sodium Carbonate

**פעילות רפואית:
משלשל.**

**התוויות:
התרופה מיועדת להקלת עצירות.**

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתרופה במקרה של חסימת המעיין או חוסר תפקוד כרוני של המעיין.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון.
אם הינך סובל/ת מליקוי בתפקוד: הלב, מכאב בטן חזק, מדימום בפי הטבעת, מסימנים של דלקת התוספתן (כגון כאב בטן, בחילות והקאות בלתי מזוהים).

אזהרות:

זהירות! שימוש ממושך עלול לגרום לתלות בתכשירים משלשלים כגון זה.
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 6 בלי להיוועץ ברופא. אם ידועה לך כל רגישות למזון או תרופה עליך להודיע על כך לרופא.
תכשיר זה מיועד רק לעצירות הנמשכת מספר ימים. חוסר פעילות המעיין ליום או יומיים אינו מצדיק שימוש בו. כמו כן אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון "ניקוי הגוף" וכדומה.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות משלשלות אחרות.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון פריחה.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

גריו מקומי או דלקת: הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

מינון:

בהעדר הוראה אחרת מהרופא המינון המומלץ הוא:
פתילה אחת לפי הצורך.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות וילדים מתחת לגיל 6 שנים בלי להיוועץ ברופא.
אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע יש לפנות לרופא.

שים לב:

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

הוראות שימוש:

הסר/י העטיפה מן הפתילה, ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחדרה.
שכב/י על צדך והחדר/י הפתילה עמוק לתוך פי הטבעת בעזרת האצבע. רחץ/י היטב את ידך.
יש להקפיד על שתיית נוזלים במשך היום שתעזור בריכוך הצואה. התכשיר פועל בדרך כלל תוך 15-60 דקות.

מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה.
הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום קריר.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר!
בכל מקרה של ספק עליך להתייעץ עם הרוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

היצרן: סם-און בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים