

## ADKES® / ADEX® FORTIS® פורטה-קפליות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986.  
קרא/י בעיון את העלון עד סופו לפני השימוש בתרופה.

**הרכב אדקס:** כל קפליה מכילה: מרכיב פעיל: Ibuprofen 200 mg  
Microcrystalline cellulose, maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, carmellose sodium, silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, titanium dioxide, E127 lake, macrogol, E104 lake, E133 lake, carnauba wax, talc.

**הרכב אדקס פורטה:** כל קפליה מכילה: מרכיב פעיל: Ibuprofen 400 mg  
Microcrystalline cellulose, maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, carmellose sodium, silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, macrogol, titanium dioxide, talc, carnauba wax.

**התוויות:** אדקס ואדקס פורטה הן תכשירים מרובות המיועדים לטיפול בנפיחות, כאבי ראש, כאבי שיניים, כאבי מחזור (שיניים) ונזעים מבעיה רפואית, כאבי גב, כאבי שרירים, נגודי דלקות ומשככי כאבים ברולקת מפרקים שרירונתית ובמחלות מפרקים ונויות. **אדקס** מיועד גם להורדת חום.

### מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמש בתרופה כאשר היך בהריון. אין להשתמש אם ידועה רגישות לתרופה או לאחר מרכיבי התרופה. אין להשתמש בתרופה אם ידועה רגישות לאיבופרופן, לסליצילטים (כגון אספירין) ולמשככי כאבים/מורידים חום נגודי דלקת אחרים שאינם סטרואידים. אין לטול בו זמנית עם תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים. אין להשתמש בתרופה אם היך סובלת או סבלת בעבר מאולקוס - כיב עיכול. אין להשתמש אם עברת זה עתה או אם היך עומדת/לעבור ניתוח לב.

**אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:** אם היך מניקה, אם היך מתכוונת להיכנס להריון, אם יש לך כאב בטן, או אם היך סובלת או סבלת בעבר ממחלות לב, מליקוי בתיפקוד מערכת הנשימה (כגון אסתמה), יתר לחץ דם, הכבד או הכליה, מערכת הרת, מערכת העיכול כגון צרבת, כאבי בטן (כולל אלכוהוליים היכול לגרום לרעילות במערכת העיכול), מערכת הדם (כגון קרישה אנמיה), פוליפים באף, זאבת אדמונית, אלכוהוליזם, כיבים, פצעים או כתמים לבנים בפה. אם היך ממעל גיל 65, אם היך נטולת משתנים בחולים הסובלים מבעיות (כגון נפיחות ברגליים) או סוכרת, יתכן שתפוגע מאובר לכשל כליתי. אם נטילת התרופה מקבוצת זו או כל משכך כאבים אחר, הרמה בעבר לטיפולך לואי מתורבת.

**אין תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?** בחולים מסוימים תרופה זו עלולה לגרום לנמנום, סחרחורת או טשטוש ראייה. אם חשית בחופות אלה לאחר השימוש בתכשיר, עלך להיזהר בנהיגה ברכב או בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות. כאשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה או אפוינים או ממשקלות בקרבת הכביש וכדומה.

**אדקס או אדקס פורטה** עלולים לגרום לרגישות יתר עם תשיפה לשמש; על כן יש להימנע מחשיפה לשמש ולדאוג להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו').

**אזהרות:** נטילת תכשיר זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה, במיוחד אם: עברת גיל 65; היך נטלת תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים; היך צורכת יותר מ-3 ממשקלות אלכוהוליים ליום.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או במשך תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. נטילת תכשיר זה במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או התקף לב ולדיומם בקיבה.

בתקופת טיפול ממושכת **באדקס** או **באדקס פורטה** יתכן ויהיה צורך לערוך בדיקות: דם, תפקוד כבד וכליה, שתן, עיניים. אם היך רגיש/למוזן כלשהו או לתרופה כלשהי כמיוחד אספירין, לסליצילטים או נגודי דלקת שאינם סטרואידים אחרים, עלך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. עלך לרופא לרופא על נטילת התרופה אם היך עומדת/לעבור ניתוח (כולל ניתוח שיניים) לאחר התרופה עלולה להגביר את הסיכון לדימום. עלך לרופא אם היך עומדת/לעבור ניתוח מעבדיות, מאחר שהטיפול עלול להפריע לתוצאות הבדיקה. תרופה זו עלולה לגרום לדימומים ולרעילות (כגון: פריחה עורית, גודש, שפחויות בעור, נפיחות בפנים, קוצר נשימה, המרמה של אסתמה, הלם שוק). הפסקה/הפסקה ופניה לרופא, אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם הכאבים נמשכים יותר מ-10 ימים או אם האוזר הכואב נפוח או אדום או בהופעת סימנים חדשים.

## אדיקס® / אדיקס® פורטה - חביסולות

נشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦.

إقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

**تركيب اديكس:** كل حبيسولة (حبة بشكل كبسولة) تحتوي: مادة فعالة: Ibuprofen 200 mg  
مواد غير فعالة: Microcrystalline cellulose, maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, carmellose sodium, silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, titanium dioxide, E127 lake, macrogol, E104 lake, E133 lake, carnauba wax, talc.

**تركيب اديكس فورته:** كل حبيسولة (حبة بشكل كبسولة) تحتوي: مادة فعالة: Ibuprofen 400 mg  
مواد غير فعالة: Microcrystalline cellulose, maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, carmellose sodium, silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, macrogol, titanium dioxide, talc, carnauba wax.

**الإستطبات:** اديكس و اديكس فورته مما مستحضران من فصيلة المستحضرات المضادة للإلتهاب الالاستيرويديه. مخصصان لتسكين الآلام الخفيفة حتى المتوسطة كالصداع، آلام الأسنان، آلام الدورة الشهرية (غير الناتجة عن مشكلة طبية)، الآلام العظمية، الآلام العضلات، مضافان للإلتهاب ومسكنان للآلام في الإلتهاب المفصل الروماتيزمي وفي مرض المفصل الشموري. اديكس مخصص أيضاً لتخفيض السخوة.

مתי لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا تستعملي هذا الدواء عندما تكونين في فترة الحمل. لا يجوز لك إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية للدواء أو لأحد مركباته. لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية للإيبوبروفن، للسالييلات (كأسپيرين) وسكنبات الآلام/مخفضات السخوة المضادة للإلتهاب الالاستيرويديه الأخرى. لا يجوز تناول هذا الدواء بشكل متزامن مع أدوية أخرى من فصيلة مضادات الإلتهاب الالاستيرويديه. لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كنت تعانين/إن أو إذا عانيت في الماضي من القرحة - قرحة قضيمة. لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا إجنزت في الأونة الأخيرة أو إذا كنت على وشك إجنيزار عملية جراحية في القلب.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً. عندما تكونين في فترة الرضاعة، إذا كنت تخططين للحمل، إذا وجد لديك ألم في البطن أو إذا كنت تعانين/إن أو إذا عانيت في الماضي من أمراض القلب، من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي (كالتبرو)، ضغط الدم العالي، الكبد أو الكلى، المسالك البولية، الجهاز الهضمي كالحرقه، آلام في البطن (بما في ذلك الإدمان على الكحول الذي يستلحق أن يسبب التسمم في الجهاز الهضمي)، جهاز الدم (كالتخثر، فقر الدم)، زوائد أنفية، ذئبة حمامية، الإدمان على الكحول، تقرحات، جروح أو بقع بضيضاء في الفم. إذا كنت في سن ما فوق 6٠ عاماً، إذا كنت تتناولين/ين الأدوية المدرة للبول. لدى المرضى الذين يعانون من وذمات (مثل إنتفاخ الرئتين) أو سكري، من الجائز حصول خطورة متزايدة لفشل كلوي. إذا تم تناول دواء من هذه الفصيلة أو كل مسكن آخر للآلام، سبب لك في الماضي أعراضاً جانبية خطيرة. كيف سيؤثر هذا الدواء على سبب امورك اليومية؟ قد يسبب هذا الدواء لدى أشخاص معينين النعاس، الدوار أو الترشوش في الرؤية. إذا شعرت بهذه الأعراض بعد إستعمالك للمستحضر، يجب إتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات أو تشغيل ماكينات خطرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة. يجب تحذير الأطفال/ة من ركوب الدراجات، اللعب بمقربة من حركة المرور وما شابه.

قد يسبب اديكس و اديكس فورته حساسية زائدة خاصة عند تعرضك للشمس؛ لذا تجنب/ي التعرض لها واحترس/ي منها وذلك بإتخاذ وسائل الحماية الكافية (كالبسمة الطويلة، قبعة، مراهم واقية وألح). تحذيرات: إن تناول هذا المستحضر سيكته أن يؤدي إلى إزف دموي في المعدة، خاصة إذا تجاوزت سن الـ 6٠ عاماً؛ إذا كنت تتناولين/ين أدوية أخرى من فصيلة مضادات الإلتهاب الالاستيرويديه؛ إذا كنت تشربين/ين أكثر من ٣ مشروبات كحولية في اليوم. لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء في فترات متتالية أو لفترة طويلة بدون إستشارة الطبيب. كما إن تناول هذا المستحضر يجبر على مائة أعلى من الوصفي بها أو إذا تم ذلك لفترة طويلة، قد يزيد من خطورة حصول السكسة الدماغية أو النوبة القلبية والذريف الدموي في المعدة. خلال العلاج المتواصل باديكس أو باديكس فورته يمكن أن تكون هناك حاجة لإجراء الفحوص للدم، لو وظائف الكبد والكلى، للبول، للعينين. يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك أو تطعم أو عتاقية خاصة أسبوعين، ساسييلات أو مضادات الإلتهاب الالاستيرويديه الأخرى، قبل إستعمالك للدواء. يجب إبلاغ الطبيب عن تناولك لهذا الدواء إذا كنت مقدماً/ة على إجراء عملية جراحية (بما في ذلك جراحة الأسنان) نظراً لأن هذا الدواء يمكن أن يزيد الإحتمال لحدوث النزف الدموي. يجب إبلاغ الطبيب عن تناولك لهذا الدواء إذا كنت مقدماً/ة على إجراء فحوص مخبرية، نظراً لأن العلاج بهذا الدواء قد يعرقل من نتيجة هذه الفحوص. إن تناول هذا الدواء، قد يؤدي إلى ظهور أعراض حساسية كالطفح الجلدي، حكة، وحبسولات في الجلد، إنتفاخ في الوجه، قصر في التنفس، تقادم الربو، صدمة إستهوائية.

توقف/ي عن إستعمال الدواء وراجع/ي الطبيب، إذا إستمرت السخوة لفترة تزيد عن ٣ أيام أو إذا إستمرت الآلام لفترة تزيد عن ١٠ أيام أو عندما تكون المنطقة المؤلمة منتفخة أو موهمة أو في حالة ظهور أعراض جديدة.

## ADEX®/ ADEX® FORTE - CAPLETS

Patient package insert according to Pharmacists' Regulations (Preparations), 1986.

Carefully read the entire package insert before using this medication.

**Composition of Adex:** Each caplet contains:

Active ingredient: Ibuprofen 200 mg  
Inactive ingredients: Microcrystalline cellulose, maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, carmellose sodium, silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, titanium dioxide, E127 lake, macrogol, E104 lake, E133 lake, carnauba wax, talc.

**Composition of Adex Forte:** Each caplet contains:

Active ingredient: Ibuprofen 400 mg  
Inactive ingredients: Microcrystalline cellulose, maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, carmellose sodium, silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, macrogol, titanium dioxide, talc, carnauba wax.

**Indications:** Adex and Adex Forte belong to a group of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Adex and Adex Forte are intended for the relief of mild to moderate pain, such as: headache, toothache, menstrual pain (not from a medical problem), backache, muscle ache; anti-inflammatory and analgesic for rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Adex is also intended for the reduction of fever.

When should this medicine not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant. Do not use this medicine if you are aware of any hypersensitivity to the medicine or any of its ingredients. Do not use this medicine if you are aware of any hypersensitivity to ibuprofen, salicylates (such as aspirin) and other non-steroidal anti-inflammatory pain relievers/fever reducers. Do not use this medicine concurrently with other NSAIDs.

Do not use this medicine if you are suffering or have suffered in the past from an ulcer - peptic ulcer.

Do not use this medicine if you have just undergone or are about to undergo heart surgery.

Do not use this medicine without consulting your physician before commencing treatment: If you are breastfeeding, if you are planning to become pregnant, if you have abdominal pain, or if you suffer, or have suffered in the past, from impaired function of the respiratory system (e.g. asthma), hypertension, the liver or kidney, the urinary tract, the digestive system such as heartburn, abdominal pain (including alcoholism which can cause toxicity in the digestive system), the blood system (e.g. coagulation disorder, anemia), from nasal polyps, lupus erythematosus, alcoholism, ulcers, sores or white spots in the mouth. If you are above 60 years of age, if you take diuretics. In patients suffering from edema (such as swelling of the legs) or diabetes, there may be an increased risk of kidney failure. If using a medicine from this group, or any other analgesic, caused serious side effects in the past.

How will this medicine influence your daily schedule? In some people this medicine may cause drowsiness, dizziness or blurred vision. If you experienced any of these side effects after using this medicine, you should be careful when driving, operating dangerous machinery or when engaging in any other activity which requires alertness. Children should be cautioned against bicycle riding or playing near traffic, etc.

Adex or Adex Forte may cause special sensitivity when the patient is exposed to the sun; therefore, avoid exposure to the sun and take appropriate precautions (long clothes, a hat, protective creams, etc.).

Warnings: Taking this medicine may cause stomach bleeding, especially if you are over 60 years of age, if you are taking other NSAIDs, if you consume more than three alcoholic drinks a day. Do not use this medicine frequently or for prolonged periods without consulting your physician. Taking this medicine at a higher dose than that recommended or for a prolonged period may increase the risk of stroke, heart attack and stomach bleeding. During long term treatment with Adex or Adex Forte, there may be a need to conduct the following tests: blood, liver and kidney function, urine, eye examination.

If you are aware of any sensitivities to foods or drugs, especially aspirin, salicylates or other NSAIDs, inform your physician before taking this medicine.

Inform your physician that you are taking this medicine if you are about to undergo surgery (including dental surgery) as it is liable to increase the risk of bleeding. Inform your physician if you are about to undergo laboratory tests, as this medicine may interfere with test results.

This medicine may cause allergic reactions such as: skin rash, itching, skin blisters, facial swelling, shortness of breath, worsening of asthma, shock. Stop using the medicine and refer to your physician if fever lasts for more than 3 days, if pain persists more than 10 days, if the painful area is swollen or red, or if new symptoms appear.

Continued

**Drug interactions:** If you are taking other medicines concurrently, or have just completed treatment with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards or inefficacy arising from drug interactions, especially in regard to drugs belonging to the following groups: other medicines containing ibuprofen, salicylates (e.g. aspirin), and other anti-inflammatory pain relievers/fever reducers, paracetamol, anticoagulants (e.g. warfarin, heparin), diuretics, antihepatitis/fever beta-blockers or captopril, probenecid, digoxin (for heart diseases), lithium, steroids, methotrexate (mainly for treatment of malignant diseases, psoriasis and rheumatoid arthritis), cyclosporine (for suppressing the immune system), antibiotics of the quinolone group (e.g. ciprofloxacin), mifepristone (if taken within 12 days preceding use of this medicine), antiabetics (ibuprofen may increase the action of these medicines thereby necessitating a change of dosage), valproic acid (mainly for epilepsy and convulsions) (concurrent use may increase the risk of bleeding), cochlincine (concurrent use may cause an increased risk of ulcers or gastrointestinal bleeding).

**Side effects:** In addition to the desired effect of the medicine, some side effects may appear during treatment, such as: diarrhea, drowsiness, dizziness, headache, skin sensitivity to the sun, tiredness. In rare cases, tingling in the hands and feet, tinnitus [ringing in the ears], mood changes and confusion have been reported. If these effects are bothersome or persist for more than a few days, contact your physician.

**Side effects requiring special attention:** Signs of allergy such as: skin rash, itching, skin blisters, facial swelling, rapid irregular heartbeat or pulse, lightness in chest, wheezing, shortness of breath, worsening of asthma, shock (anaphylaxis); vision or hearing disturbances, seeing/hearing strange things; ulcer, pain, cramps or burning sensation in the abdomen, chest pain, indigestion, malaise, nausea, heartburn, vomiting, edema, fluid retention (e.g. swelling of the feet); symptoms of meningitis (e.g. headache, fever, stiff neck), rigidity, spinal pain: **discontinue treatment and contact your physician immediately!** There are rare reports of skin peeling (e.g. swelling of the feet); symptoms of meningitis (e.g. headache, fever, stiff neck), rigidity, spinal pain: **discontinue treatment and contact your physician immediately!** There are rare reports of skin peeling; liver problems, yellowing of the eyes and/or the skin, blood system problems, bruising; kidney problems, severe sore throat with high fever: **discontinue treatment and contact your physician immediately!** If you experience fainting, bloody vomit, bloody or black stools - **discontinue treatment and contact your physician immediately!** If you experience side effects not mentioned in this insert, or if you feel any change in your general health, contact your physician immediately.

**Dosage:** Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician:  
**Adex:** Adults and children above the age of 12 years: 1-2 caplets 1-3 times a day. Do not take more than 6 caplets in 24 hours.  
**Adex Forte:** Adults and children above the age of 12 years: one caplet 1-3 times a day. Do not take more than 3 caplets in 24 hours.

For relief of menstrual pain start treatment as soon as the pain appears.  
 Dosage for children: Use of **Adex** or **Adex Forte** in children under the age of 12 years must be under medical surveillance. Do not exceed the recommended dosage. Take the lowest dose that achieves the treatment objective.  
 When treatment is chronic, this medicine is to be taken at regular intervals.  
 If you have forgotten to take a dose at the specified time, take it as soon as you remember unless the time of the next dose is close; never take two doses together!

**Directions for use:** Can be halved, can be crushed! This medicine should be swallowed with a full glass of water with or immediately after a meal.

**Caution:** Do not induce vomiting without explicit instructions from a physician! Medicines should not be taken in the dark! Check the label and the **dose** every time you take this medicine. Wear glasses if you need them.  
**Storage:** Store in a cool place protected from penetration of air and moisture (not in the refrigerator). Even if kept in their recommended storage conditions, drugs retain their potency for a limited period only. Please note the expiry date of this medicine. If in doubt, consult with the dispensing pharmacist. Do not store different medicines in the same container.

**Registration number of the drug:**  
**Adex:** 039 71 26007 00. **Adex Forte:** 110 28 29270 00.

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health (MOH) and its content was checked and approved by the MOH.



חמה

**החבולא בין הרופואה:** אם הירך נוטל/ת הרופאה נוטפת, או אם סיומה זה עמה טיול בתרופה אחרת עלך לחרות לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין הרופאות. כמיושר לבכי הרופואת מוקבולוא הבאות: הרופואת אחרות המכילות איבופרופן, סליציאליס (כגון אספירין), מסככי כאבים/מורידו כאב, מוגדי ללוקא אחרים, פאראאטמול, הרופואת נגד קרישה דם (כגון ורופין, הפרין), משנהם, הרופואת לחרודת לוך דם (כגון חוסמי סגה או קופטופריל), פאננציד, דיולקס (למחלות לג), לוחים, סטאטיים, מואטורקסט (לטיפול בעיקר במחלות ממארות, ספוחת וילקוה ספרקום שגיומה), צוקלופפרון (לדיכוי מערכת החיסון), אנטיביוטיקות מוקבוצה הקווימוליס (כגון צופרופלוקסון), מפפריסטון (אם נלוקח בתוך 12 ימים שקדמו לנטילת הרופאה זאת), הרופואת לטיפול בסוכרת (יתכן שאיבופרופן מגביר את הפעילות של הרופואת אלו ויהיה צורך לשנות את המינון), חומצה ולפראואי (מאליפלסיה ועיוותות בעיקר) (יתכן ששימוש בו ממית מגביר את הסיכון לדיומה), כולכיצין (יתכן ששימוש בו ממית יגרם לסיכון מוגבר לכיבים או דימום במערכת העיכול).

**הרופואת לוחאי:** בנוסף לפעילות הרופואת של הרופאה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוחאי, כגון: לשלול, נמנום, סחרחורת, כאב ראש, רגשות העור לשמש, עייפות. במקרים נדירים רוח על וקורח בימים או ברגליים, צלואלים באוזניים, שנינים במצב הרוח וכולכו. אם תופעות אלו מסוררות או ממשכות מעבר לימים ספורים, יש לפנות לרופא.

**הרופואת הממייכות הריומה:** סימני אלרגיה, כגון: פריחה עורית, גרד, שלפוחיות בעור, נפוחות פנים, דיפקוה לב או דיפקוה מחרים לא סדירים, לוחך בחזה, צפצפונים, קוצר נשימה, חמורה של אסמה, הלם (אנפילקטיס); הרפרות ברהאי או בשמעה, ראיות/שמעה דברים מוזרים; אולקוס, כאבים, עיוותות או תחושת שריפה בבטן, כאב בחזה, קשיי עיכול, תחושת חול, בחילה, צרבת, הקואות, בקעות, צבירת נוזלים (כגון נפוחות ברגליים), סימפסומים של דלקות קרום המוח (כגון: כאבי ראש, חום, גוואר מושקח); צפירות, כאבים בעמוד השדרה; יש להפסיק את הטיפול ולפנת לרופא מיד! יש דיווחים נדירים של קילוף עור; בעיות בלב, גרבת העיניים ו/או העור; בעיות במערכת הדם, חברות; בעיות בכליות, כאב גרון חזק עם חום גבוה; יש להפסיק הטיפול ולפנת לרופא מיד! אם הירך חשה/עלפון, הקאה דמית, צוואה דמית או שחרור - יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא!

בלב מקרה שלבו בירך מרגישה תופעות לוחאי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשה הכללית עלך להתייעץ עם הרופא מיד.

**המינון:** המינון המוקול בהערך הוראה אחרת מהרופא הינו: **אדקס:** מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 1-2 קפליות 1-3 פעמים ביום. אין לטויל יותר מ- 6 קפליות בי- 24 שעות.

**אדקס פורטה:** מבוגרים וילדים מעל גיל 12: קוליה אחת 1-3 פעמים ביום. אין לטויל יותר מ- 3 קפליות בי- 24 שעות.

להפגת כאבי מחזור יש להחיל בטיפול מיד עם הופעת הכאבים.  
 מינון לילדים: השימוש המוקול בהערך הוראה אחרת מהרופא בילדים מתחת לגיל 12 יהיה בפיקוח רפואי. אין לטויל מעל למנה המומלצת. יש לטויל את המנה הנמוכה ביותר המשיגה את מטרת השימוש. אם הטיפול הוא כרוני, יש להשתמש בתרופה בזמנים קבועים.  
 אם שכחת לטויל הרופאה בו בזמן קבוב יש לטויל מנה מיד כשנכרתה, אלא אם-כן זמן נטילת המנה הבאה קרוב; בשום אופן אין לטויל שתי מנות ביתד!

**אופן השימוש:** ניתן לחצות, ניתן לכתושו לבלוע את הרופאה עם כוס מים מלאה עם או מיד אחרי ארוחה.

**מנועי הרעלה:** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוף להשג ידם של ילדים ו/או תמוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן הרופאה, יש לפנות מיד לחרות מיו של חולים, ולהביא ראיות הרופאה איתך.

**אין לגרום להקאה:** ללא הוראה מפורשת מרופאו **אין לטויל תרופואת בחושך** יש לבדוק התוויה והמנה בכל פעם שחיוך נוטל/ת הרופאה, יש להרכיב משקפיים אם חיוך וקוזה/לחם.

**אחסנה:** במקום קריר, מוגן מחזירא אוויר ורטיבות (לא במקרר). גם לפי תנאי האריחה/אחסנה המומלצים, תרופואת שמורות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר בכל מקרה של ספק. עלך להווייעץ ברקוח שסיפק לך את הרופואה, אין לאחסן תרופואת שונות באוהה ארוכה.

**מס' רישום הרופואה:** אדקס: 039 71 26007 00. **אדקס פורטה:** 110 28 29270 00.  
 פורמט עלון זה נבגע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידי.

1200480102-1

