

אדקס® ליקווי-ג'לס - כמוסות רכות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986.
יש לקרוא בעיון את העלון עד סופו לפני השימוש בתרופה.

הרכב: אדקס ליקווי-ג'לס 200: כל כמוסה מכילה: מרכיב פעיל: Ibuprofen 200 mg
אדקס ליקווי-ג'לס 400: כל כמוסה מכילה: מרכיב פעיל: Ibuprofen 400 mg

כמו-כ: Macrogol, purified water, potassium hydroxide, gelatin, sorbitol, sorbitan, maize starch, higher polyoles, mannitol, blue E-131, titanium dioxide.

התוויות: אדקס ליקווי-ג'לס 200 ו- 400 מ"ג הינם תכשירים מקבוצת התכשירים נוגדי דלקות לא סטרואידליים. התכשירים מיועדים לשיכוך כאבים קלים עד בינוניים כגון: כאבי ראש, שיניים, מחזור (שאנם נובעים ממנעה רפואית), כאבי גב ושרירים. נוגדי דלקות במחלות שגרומות (רואמטיות) ולוהרות חום.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמש בתרופה כאשר הינך בהריון, אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לתרופה או לאחד ממרכיביה. אין להשתמש בתרופה אם ידועה רגישות לאיבופרופן, לסליצילטים (כגון אספירין) ולמשככי כאבים/מורידיו חום נוגדי דלקות אחרים שאינם סטרואידים. אין ליטול בו זמנית עם תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקות שאינם סטרואידים. אין להשתמש בתרופה אם הינך סובלת/אז סבלת בעבר מאולקוס - כיב עיכולי. אין להשתמש אם עברת זה עתה או אם הינך עומד/ת לעבור ניתוח לב.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך מיניקה, אם תסתמך להיכנס להריון, אם יש לך כאב בטן, או אם הינך סובלת/אז סבלת בעבר ממחלות לב, מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסתמה), יתר לחץ דם, הבדב, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול כגון צרבת, כאבי בטן (כולל אלקוהוליזם יכול לגרום לרעילות במערכת העיכול), מערכת הדם (כגון קרישה, אנמיה), פוליוס באף, צאבת אדמנית, אלקוהוליזם, כיבים, פצעים או כתמים לבנים בפה. אם הינך מעל גיל 60, אם הינך נוסע/ת משתמם בחולמים הסובלים מבצקות (כגון נפיחות ברגליים) או סוכרת יתכן סיכון מוגבר לכשל כליתי. אם נטילת התרופה מקבוצת זו או כל משכך כאבים אחר, גרמה בעבר לתופעות לוואי חמורות. **אין תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך:** בחולים מסוימים תרופה זו עלולה לגרום לנמנום, סחרחורת או טשטוש ראייה. אם חשת בתופעות אלה לאחר השימוש בתכשיר, עליך להיזהר בנהיגה ברכב או בהפעלת מכונות ובכל פעילות המחייבת עירנות. באשר לילדים, יש להזהר מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אדקס ליקווי-ג'לס עלול לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש; על כן יש להימנע מחשיפה לשמש ולדאוג להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו').

אזהרות: נטילת תכשיר זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה, במיוחד אם: עברת גיל 60; הינך נטלת תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקות שאינם סטרואידים; הינך צורך/ת יותר מ-3 מ' משקאות אלקוהוליים ליום. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. נטילת תכשיר זה במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או התקף לב ודימום בקיבה. בתקופת טיפול ממושכת **באדקס ליקווי-ג'לס** יתכן ויהיה צורך לערוך בדיקות: שתן, עיניים, דם, תפקוד כבד וכליה.

אם הינך רגיש/ת למונח לרפואה כלשהי, במיוחד נטילת התרופה, עליך לדווח לרופא שאינם סטרואידים אחרים. עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. עליך לדווח לרופא על נטילת התרופה אם הינך עומד/ת לעבור ניתוח (כלל ניתוח שיניים) מאחר והתרופה עלולה להגביר את הסיכון לדימום. עליך לדווח לרופא אם הינך עומד/ת לעבור בדיקות מעבדה, מאחר והטיפול עלול להפריע לתוצאות הבדיקה. תרופה זו עלולה לגרום לתופעות אלרגיות כגון: פריחה עורית, גרד, שלפוחיות בעור, נפיחות בפנים, קוצר נשימה, החמרה של אסתמה, חלם (שוק). הפסק/ השימוש פונה/ לרופא, אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם הכאבים נמשכים יותר מ-10 ימים או אם האוזר הכואב נפוח או אדום או בהופעת סימנים אחרים.

התגובות בין תרופתיות: אם הינך נטלת תרופה נוספת, או אם סימנת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המפסי כדי למנוע סיכונים או אינטראקציות. תרופות אחרות המכילות איבופרופן, לסליצילטים (כגון אספירין), ומשככי כאבים/מורידיו חום נוגדי דלקות אחרים, פאראצטמול, תרופות נגד קרישה דם (כגון ורופין, פראן), משתנים, תרופות להורדת לחץ דם (כגון חוסמן בטא או תופסטריל), פרופנובד,

המשך מעבר לדף

אדיקס® ליקווי - ג'לס - كبسولات ليّنة

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦.
إقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

التكوين: أديكس لיקوي - ج'لس ٢٠٠: كل كبسولة تحتوي: مادة فعالة: Ibuprofen 200 mg
أديكس لיקوي - ج'لس ٤٠٠: كل كبسولة تحتوي: مادة فعالة: Ibuprofen 400 mg

كما تحتوي الكبسولات: Macrogol, purified water, potassium hydroxide, gelatin, sorbitol, sorbitan, maize starch, higher polyoles, mannitol, blue E-131, titanium dioxide.

الإستخدامات: أديكس لיקوي - ج'لس ٢٠٠ و ٤٠٠ ملغ هما مستحضران من فصيلة المستحضرات المضادة للإلتهاب الأستروئيدية. مستحضران مخصصان لتسكين الآلام الخفيفة حتى المتوسطة كالأصداغ، الآلام الأسنان، الآلام الدورة الشهرية (غير الناتجة عن مشكلة طبية)، الآلام الظهر والآلام العضلات. مضادان للإلتهايات في أمراض الروماتيزم ولتخفيض السخونة.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا تستعلمي هذا الدواء عندما تكونين في فترة الحمل. لا يجوز لك إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية للدواء أو لأحد مركباته. لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية للإيبوبروفن، للسالييلات (كالأسبرين) ولמשكبات السخونة المضادة للإلتهاب الأستروئيدية الأخرى. لا يجوز تناول هذا الدواء بشكل متزامن مع أدوية أخرى من فصيلة مضادات الإلتهاب الأستروئيدية. لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كنت تعانين/ن أو إذا عانيت في الماضي من القرحة - قرحة هضمية. لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا إجتزت في الآونة الأخيرة أو إذا كنت على وشك إجتياز عملية جراحية في القلب.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الرضاعة، إذا كنت تخططين للحمل، إذا وجد لديك ألم في البطن أو إذا كنت تعانين/ن أو إذا عانيت في الماضي من أمراض القلب. من خلال في وظيفة الجهاز التنفسي (كأربو)، ضغط الدم العالي، الكبد، الكلى/المسالك البولية، الجهاز الهضمي، الحرقان، آلام في البطن (بما في ذلك الإدمان على الكحول الذي يستطيع أن يسبب التسمم في الجهاز الهضمي)، جهاز الدم (كالتخثر، فقر الدم)، زواش أنفية، ثنية حمامية، الإدمان على الكحول، تقرحات، جروح أو بقع بيضاء في الفم، إذا كنت في سن ما فوق ٦٠ عاماً، إذا كنت تتناولين/ين الأدوية المدرة للبول.

لدى المرضى الذين يعانون من وذمات (مثل إنتفاخ الرئتين) أو سكري، من الجائز حصول خطورة متزايدة للفشل الكلوي. إذا لم تتناول دواء من هذه المجموعة إلا في حالات الطوارئ، يجب لك في الماضي أعراضاً جانبية خطيرة.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟ قد يسبب هذا الدواء لدى أشخاص معينين التماس، الدوار أو التشنج في الرقبة. إذا شعرت بهذه الأعراض بعد إستعمالك المستحضر، يجب إتخاذ الحيلة والحذر أثناء قيادة المركبات أو تشغيل آلات خطرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة. يجب تحذير الطفل/ة من ركوب الدراجات، اللعب بمفرده من حركة المرور وما شابه.

قد يسبب أديكس لיקوي - ج'لس حساسية زائدة خاصة عند تعرضك للشمس؛ لذا تجنب/ي التعرض لها واحترس/ي منها وذلك بإتخاذ وسائل الحماية الكافية (كاللبسة الطويلة، قبعة، مرهم واقية وإلخ).

تحذيرات: إن تناول هذا المستحضر يمكنه أن يؤدي إلى نرف دموي في المعدة، خاصة إذا: تجاوزت سن الـ ٦٠ عاماً؛ إذا كنت تتناولين/ين أدوية أخرى من فصيلة مضادات الإلتهاب الأستروئيدية؛ إذا كنت تشرب/ين أكثر من ٣ مشروبات كحولية في اليوم. لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء في فترات متعاقبة أو لفترة طويلة بدون إستشارة الطبيب.

كما أن تناول هذا المستحضر بجرعات عالية أعلى من الموصى بها أو إذا تم ذلك لفترة طويلة، قد يزيد من خطورة حصول السكتة الدماغية أو الثوبه القلبية والنزيف الدموي في المعدة. خلال فترة العلاج المتواصلة بأديكس لיקوي - ج'لس يمكن أن تكون هناك حاجة لإجراء الفحوص للبول، للعينين، للدم، لوظائف الكبد والكلى.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك للحمام أو عقاقير خاصة أسبرين، سالييلات أو مضادات الإلتهاب الأستروئيدية الأخرى، قبل إستعمالك للدواء.

يجب إبلاغ الطبيب عن تناولك لهذا الدواء إذا كنت مقدماً/ة على إجراء عملية جراحية (بما في ذلك جراحة الأسنان) نظراً لأن هذا الدواء يمكنه أن يزيد الإحتمال لحصول النزف الدموي. يجب إبلاغ الطبيب عن تناولك لهذا الدواء إذا كنت مقدماً/ة على إجراء فحوص مخبرية، نظراً لأن العلاج بهذا الدواء قد يعرقل من نتيجة هذه الفحوص. إن تناول هذا الدواء قد يؤدي إلى ظهور أعراض تحسسية كالطفح الجلدي، حكة، حويصلات في الجلد، إنتفاخ في الرقبة، قصر في التنفس، تقادم الربو، صدمة إستهدافية.

توقف/ي عن إستعمال الدواء وراجع/ي الطبيب، إذا إستمرت السخونة لفترة تزيد عن ٢ أيام أو إذا إستمرت الآلام لفترة تزيد عن ١٠ أيام أو عندما تكون المنطقة المؤلمة منتفخة أو حمراء أو في حالة ظهور أعراض جديدة.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطين/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: أدوية أخرى تحتوي على إيبوبروفن، سالييلات (كالأسبرين) ومسكنات الآلام/مخفضات السخونة الأخرى المضادة للإلتهاب.

يتبع

ADEX® LIQUI-GELS - Soft Capsules

Patient package insert according to Pharmacists' Regulations (Preparations), 1986.

Carefully read the entire package insert before using this medication.

Composition of Adex Liqui-Gels 200: Each capsule contains:

Active ingredient: Ibuprofen 200 mg

Composition of Adex Liqui-Gels 400: Each capsule contains:

Active ingredient: Ibuprofen 400 mg

The capsules also contain: Macrogol, purified water, potassium hydroxide, gelatin, sorbitol, sorbitan, maize starch, higher polyoles, mannitol, blue E-131, titanium dioxide.

Indications: Adex Liqui-Gels 200 and 400 mg belong to a group of medicines known as non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). These preparations are intended for the relief of mild to moderate pain, such as: headache, toothache, menstrual pain (not from a medical problem), backache, muscle ache; anti-inflammatory for rheumatic diseases and for the reduction of fever.

When should this medicine not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant. Do not use this medicine if you are aware of any hypersensitivity to the medicine or any of its ingredients. Do not use this medicine if you are aware of any hypersensitivity to ibuprofen, salicylates (such as aspirin) and other non-steroidal anti-inflammatory pain relievers/fever reducers. Do not use this medicine concurrently with other NSAIDs. Do not use this medicine if you are suffering or have suffered in the past from an ulcer - peptic ulcer. Do not use this medicine if you have just undergone or are about to undergo heart surgery.

Do not use this medicine without consulting your physician before commencing treatment: If you are breastfeeding, if you are planning to become pregnant, if you have abdominal pain, or if you suffer, or have suffered in the past, from heart diseases, from impaired function of: the respiratory system (e.g. asthma), hypertension, the liver, the kidney/urinary tract, the digestive system such as heartburn, abdominal pain (including alcoholism which can cause toxicity in the digestive system), the blood system (e.g. coagulation disorder, anemia), from nasal polyps, lupus erythematosus, alcoholism, ulcers, sores or white spots in the mouth. If you are above 60 years of age, if you take diuretics. In patients suffering from edema (such as swelling of the legs) or diabetes, there may be an increased risk of kidney failure. If using a medicine from this group, or any other analgesic, caused serious side effects in the past.

How will this medicine influence your daily schedule? In some people this medicine may cause drowsiness, dizziness or blurred vision. If you experienced any of these side effects after using this medicine, you should be careful when driving, operating dangerous machinery or when engaging in any other activity which requires alertness. Children should be cautioned against bicycle riding or playing near traffic, etc.

Adex Liqui-Gels may cause special sensitivity when the patient is exposed to the sun; therefore, avoid exposure to the sun and take appropriate precautions (long clothes, a hat, protective creams, etc.).

Warnings: Taking this medicine may cause stomach bleeding, especially if you are over 60 years of age, if you are taking other NSAIDs, if you consume more than three alcoholic drinks a day.

Do not use this medicine frequently or for prolonged periods without consulting your physician. Taking this medicine at a higher dose than that recommended or for a prolonged period may increase the risk of stroke, heart attack and stomach bleeding. During long term treatment with Adex Liqui-Gels, there may be a need to conduct the following tests: urine, eye examination, blood, liver and kidney function.

If you are aware of any sensitivities to foods or drugs, especially aspirin, salicylates or other NSAIDs, inform your physician before taking this medicine.

Inform your physician that you are taking this medicine if you are about to undergo surgery (including dental surgery) as it is able to increase the risk of bleeding. Inform your physician if you are about to undergo laboratory tests, as this medicine may interfere with test results.

This medicine may cause allergic reactions such as: skin rash, itching, skin blisters, facial swelling, shortness of breath, worsening of asthma, shock. Stop using the medicine and refer to your physician if fever lasts for more than 3 days, if pain persists more than 10 days, if the painful area is swollen or red, or if new symptoms appear.

Drug interactions: If you are taking other medicines concurrently, or have just completed treatment with another medicine, inform your physician in order to prevent hazards or inefficacy arising from drug interactions, especially in regard to drugs belonging to the following groups: other medicines containing ibuprofen, salicylates (e.g. aspirin), and other anti-inflammatory pain relievers/fever reducers, paracetamol, anticoagulants (e.g. warfarin, heparin), diuretics, antihypertensives (e.g. beta-blockers).

See next page

ADEX® LIQUI-GELS - Soft Capsules

Continued

or captopril), probenecid, digoxin (for heart diseases), lithium, steroids, methotrexate (mainly for treatment of malignant diseases, psoriasis and rheumatoid arthritis), cyclosporine (for suppressing the immune system), antibiotics of the quinolone group (e.g. ciprofloxacin), mifepristone (if taken within 12 days preceding use of this medicine), antidiabetics (ibuprofen may increase the action of these medicines thereby necessitating a change of dosage), valproic acid (mainly for epilepsy and convulsions) (concurrent use may increase the risk of bleeding), colchicine (concurrent use may cause an increased risk of ulcers or gastrointestinal bleeding).

Side effects: In addition to the desired effect of the medicine, some side effects may appear during treatment, such as: diarrhea, drowsiness, dizziness, headache, skin sensitivity to the sun, tiredness. In rare cases, tingling in the hands and feet, tinnitus (ringing in the ears), mood changes and confusion have been reported. If these effects are bothersome or persist for more than a few days, contact your physician.

Side effects requiring special attention: Signs of allergy such as: skin rash, itching, skin blisters, facial swelling, rapid irregular heartbeat or pulse, tightness in chest, wheezing, shortness of breath, worsening of asthma, shock (anaphylaxis); vision or hearing disturbances, seeing/hearing strange things; ulcer, pain, cramps or burning sensation in the abdomen, chest pain, indigestion, malaise, nausea, heartburn, vomiting, edema, fluid retention (e.g. swelling of the feet); symptoms of meningitis (e.g. headache, fever, stiff neck); rigidity, spinal pain: discontinue treatment and contact your physician immediately! There are rare reports of skin peeling; liver problems, yellowing of the eyes and/or the skin; blood system problems, bruising; kidney problems, severe sore throat with high fever: discontinue treatment and contact your physician immediately!

If you experience fainting, bloody vomit, bloody or black stools - discontinue treatment and contact your physician immediately!

If you experience side effects not mentioned in this insert, or if you feel any change in your general health, contact your physician immediately.

Dosage: Adults and children above the age of 12 years: Recommended dosage unless otherwise prescribed by your physician:
200 mg capsules: 1-2 capsules every 4-6 hours while symptoms persist. Do not take more than 6 capsules in 24 hours.
400 mg capsules: one capsule every 4-6 hours while symptoms persist. Do not take more than 3 capsules in 24 hours.

For relief of menstrual pain start treatment as soon as the pain appears.
Dosage for children: Use in children under the age of 12 years must be under medical surveillance. Do not exceed the recommended dosage. Take the lowest dose that achieves the treatment objective. When treatment is chronic, this medicine is to be taken at regular intervals.
If you have forgotten to take a dose at the specified time, take it as soon as you remember unless the time of the next dose is close; never take two doses together!

Directions for use: Do not chew! This medicine should be swallowed whole with a full glass of water with or immediately after a meal.

Avoid poisoning! This medicine, and any other medicine should be kept in a closed place out of the reach of children and/or infants to avoid poisoning. If you took an overdose, or if a child accidentally swallowed this medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the medicine package with you.

Do not induce vomiting without explicit instructions from a physician!
Medicines should not be taken in the dark! Check the label and the dose **every time** you take this medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: Store in a cool place protected from penetration of air and moisture (not in the refrigerator). Even if kept in their recommended storage conditions, drugs retain their potency for a limited period only. Please note the expiry date of this medicine. If in doubt, consult with the dispensing pharmacist. Do not store different medicines in the same container.

Registration number of the drug:
Adex Liqui-Gels 200: 130 18 30816 00. Adex Liqui-Gels 400: 130 19 30817 00.
The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health (MOH) and its content was checked and approved by the MOH.


DEXON®
 Dexon Ltd., Or-Akiva, P.O.B. 50, Hadera 38100, ISRAEL

אדיקס® ליקוי - ג'לס - כביסולאט לינע

תמנה

פארסאטאמול, מצימאדאט תצח'ר הדמ (כאלורפארין, היפארין), מדראט בולאע, מצימאדאט צעפ'ח הדמ (מחל מעיפאט הבייטא או קאפ'טוריל), פרויפניסיד, דיכוכסינ (לאמראש אלב), ליניטומ, סניטרונידאט, מיטוטראכסאט (לעלאג לאמראש הציינע בשכל קאמ, באה המדב' והתהב המאפאל הרומאטיזמי), סיקלופוספורין (לנטייב' ה'הא' המנעה), מצימאדאט חיובי' מן פסילע' האקווינלינאט (מחל סיכרופלוקסאסאין), מיפייניסטון (ינא' א'ח'ד כאלל 12 ינא' קיבל תנאול מחא הדוא), מצימאדאט הסכרי (ימכן לאיבופרופן א'ן יזי'ד מן פעאלי' ח'ק האדווי' וב'ז'ל מ'כ'ן מ'כ'ן חא'ג' לנטייב' הר'ג'ע האדווי'), מחצ' פאלירויח' (לסר'ח' והנשנ'ה' במסורה צאמ'ה) (ימכן פי חאלה' הא'ס'תמאל המ'זאמן א'ן תזא'ד הצ'ח'פורה' לחוד'ח' הנז'ף הדמוי), כולשיסינ (ימכן פי חאלה' הא'ס'תמאל המ'זאמן א'ן יזי'די א'ל'י יזיא'ה' צ'ח'פורה' חוד'ח' התצ'ח'ה' או הנז'ף פי ה'ה'א'ר'ה' השמי').

לאמראש הא'ניאני'ה:

י'זאפא'ה' א'ל'י התא'י'א'ר'א'ט'ר'ה' הפ'י'ע'ה' המ'ר'ג'ו'ב'ה' לדוא, פ'ד'ד' ת'פ'ה'ר' א'נ'א'ה' א'נ'א'ה' פ'ת'ר'ה' הא'מראש הא'ניאני'ה' כאל'ס'ה'ל, נ'עאס, דואר, מדאע, ח'סאסא'ה' הא'ג'ל' ללשמ'ש, א'ר'ה'א'ק, פי חאלא' נאדר'ה' ב'ל'ג' ע'ן ח'ז'ן פי הידי'ן או הר'ג'לי'ן, ח'ט'י'ן פי הא'ז'ני'ן, תצ'ירא'ט פי המ'זא'ן ו'א'ר'ת'ה'א. א'מא' ינא' חא'נ'ת' מח'ה' הא'מראש מ'ז'ע'ה' א'ו ינא' א'ס'תמ'ר' לאכ'ר מן א'י'א'ם מעד'ר'ה', י'ב'י'ב' מ'ר'א'ג'ע'ה' הפ'י'ע'ה'.

לאמראש הא'ניאני'ה' ת'נ'צ'ט'ז'י' א'י'ט'מא'ל'א' ח'א'ס'א': א'מראש ח'סאסא'ה' כאל'ט'ע'ה' הא'ג'ל'די, ח'כ'ה', חוי'ס'ל'א'ט' פי הא'ג'ל'ה', א'נ'ת'פ'א'ח' פי א'ר'ג'ה', ח'פ'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'ט' פי א'ר'ז'י'ה' א'ו הס'מ'ע', ר'ז'י'ה' ס'ס'ע' א'ש'י'א' ע'ר'י'ה'י'ת' ח'ר'ק'ה' פי א'ל'ע'ד'ה', א'ל'א', ת'ש'נ'ה'א'ט' א'ו הש'מ'ע'ר' ב'ח'ר'ק'ה' פי ה'ב'ט'ן, א'ל'א' פי המד'ן, ס'ע'ו'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ס'ר'ה' פי ה'ב'ט'ן, ח'ר'ק'א'ט' ח'ל'ב' א'ו ת'י'ס' ס'ר'י'ע'י'ן ע'י'ז'ר מ'ת'נ'ת'י'ן, מ'צ'ח'ט' פי המד'ן, ס'ע'י'ר, ח'ס'ר' פי התנ'ס', ת'פ'א'ח' פי א'ר'י'ו, ס'ד'מ'ה' (א'ס'ת'ה'א'ר'ה'י'ת') (א'ש'ט'ר'י'א'ב'א'