





ALPHOSYL™ “2 IN 1”



לפתיחה

MEDICAL SHAMPOO WITH CONDITIONER

בנוסף לumed השampoo בוגר וילודים

Composition:

הרכבה:

**Alcoholic extract
of coal tar 5.0% w/w**

Directions for use:

See enclosed leaflet.

Store in a cool place.

Keep out of the reach
of children.

7290008 098045

לשימוש חיצוני בלבד
لاستعمال الخارجي فقط
FOR EXTERNAL USE ONLY

Manufacturer:

Purna pharmaceuticals,
Belgium.

License Holder and Importer:

GlaxoSmithKline
(Israel) Ltd.,
25 Basel Street, Petach-Tikva.

צורה:

פורנה פארמציוטיקלים,

בלגיה.

בעל רישיון ויבואן:

אלקסוסמית'קליין

(ישראל) בעמ'

רחוב, 25, פתח-תקווה.

ALP PL-LA 01/07 LA2/2

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

Read this package insert carefully in its entirety
before using this medicine

The format of this leaflet was determined by the
Ministry of Health and its content was checked
and approved in December 2006

ALPHOSYL™ “2 in 1”

Medical shampoo with conditioner

Composition:

Alcoholic extract of coal tar 5.0% w/w

Inactive ingredients:

Sodium Lauryl Sulphate
Ammonium Lauryl Sulphate
Hexylene Glycolstearate SLS
Lauramide DEA
Herbal Fragrance
Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 2910
Citric Acid Anhydrous
Guar Hydroxy Propyl Trimonium Chloride
Methyl Parahydroxybenzoate
Propyl Parahydroxybenzoate
Patent Blue V Dye
Purified Water

Therapeutic activity:

Treatment of scalp disorders such as dandruff,
psoriasis, seborrhoea, relief of pruritus and
removal of scales often associated with
eczema.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if there is a known
sensitivity to any of its ingredients.
Do not use on a severely inflamed skin.

**Do not use this medicine without consulting a
doctor before starting treatment:**

If you are pregnant or breastfeeding.

How will this medicine affect your daily life?

This medicine may cause a special sensitivity when
the patient is exposed to the sun, therefore, avoid
exposure to the sun and take appropriate
precautions (long clothes, a hat, protective creams,
etc.).

Warnings:

If you are sensitive to any type of food or
medicine, including this medicine, inform your
doctor before commencing treatment with this
medicine.

Avoid contact of this product with the eyes. In
case of contact, rinse the eyes with water.

Drug interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if
you have just finished treatment with another
medicine, inform the attending doctor, in order to
prevent hazards or lack of efficacy arising from
drug interactions.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine,
adverse reactions may occur during the course
of treatment with this medicine, such as
sensitivity to light.

**Side effects for which special treatment is
required:**

If irritation, inflammation or rash appears at
the site of treatment (rare): discontinue
treatment and consult your doctor.

In the event that you experience side effects not
mentioned in this leaflet, or if there is a change
in your general health, consult your doctor
immediately.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by your doctor:

For treatment of dandruff:

1-2 times weekly as necessary or according
to the doctor's instructions.

For treatment of psoriasis, seborrhoea and
pruritus:

2-3 times weekly or according to the doctor's
instructions.

This medicine is not usually intended for
infants.

Attention:

This medicine is intended for external use
only.

Instructions for use:

- Wet the hair thoroughly with water, then
apply a generous amount of Alphosyl “2 in 1” and rub it rapidly into the hair and scalp.
- Rinse thoroughly with water and repeat the
procedure, massaging the scalp for several
minutes until a rich lather develops.
- Rinse thoroughly with water.

Avoid poisoning!

This medicine, and all other medicines, must be
stored in a safe place out of the reach of children
and/or infants, to avoid poisoning.

If you have taken an overdose, or if a child has
accidentally swallowed the medicine, proceed
immediately to a hospital emergency room and
bring the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed
to do so by a doctor!

Do not take medicines in the dark! Check the label
and the dose each time you take your medicine.
Wear glasses if you need them.

Storage:

In a cool place.

Even if kept in their original container and stored
as recommended, medicines may be kept for a
limited period only. Please note the expiry date of
the medicine! In case of doubt, consult the
pharmacist who dispensed the medicine to you.
Do not store different medications in the same
package.

License number: 060 84 27674 22

Manufacturer:

Purna Pharmaceuticals, Belgium.

License Holder and Importer:

GlaxoSmithKline (Israel) Ltd.,
25 Basel Street, Petach-Tikva.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ
СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986**

Внимательно и полностью прочтите данную инструкцию перед применением препарата

*Формат настоящей инструкции установлен
Министерством здравоохранения, содержание
проверено и утверждено в декабре 2006*

АЛЬФОСИЛ™ “2 в 1”

Лечебный шампунь с ополаскивателем

Состав:

Alcoholic extract of coal tar 5.0% w/w

Вспомогательные вещества:

Sodium Lauryl Sulphate

Ammonium Lauryl Sulphate

Hexylene Glycolstearate SLS

Lauramide DEA

Herbal Fragrance

Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 2910

Citric Acid Anhydrous

Guar Hydroxy Propyl Trimonium Chloride

Methyl Parahydroxybenzoate

Propyl Parahydroxybenzoate

Patent Blue V Dye

Purified Water

Терапевтическое действие:

Лечение проблем кожи головы, таких как перхоть, псориаз, себорея, облегчение зуда и удаление чешуек, зачастую сопутствующих экземе.

Противопоказания к применению:

Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности к одному из компонентов препарата.

Противопоказано применение препарата на сильно воспаленной коже.

Не применяйте препарат без предварительной консультации с врачом:
Если Вы беременны или кормите грудью.

Влияние препарата на повседневную жизнь:

Данный препарат может вызвать особую чувствительность при пребывании на солнце; избегайте пребывания на солнце и позаботьтесь о должной защите (закрытая одежда, головной убор, солнцезащитные средства и др.).

Предостережения:

До начала применения препарата следует сообщить врачу о наличии повышенной чувствительности к каким-либо продуктам питания или лекарственным препаратам. Избегайте контакта препарата с глазами. При попадании препарата в глаза - промойте водой.

Взаимодействие препаратов:

Если Вы принимаете другой лекарственный препарат или недавно закончили лечение другим препаратом, сообщите об этом лечащему врачу в целях предотвращения опасности или неэффективности лечения, связанных с взаимодействием препаратов.

Побочные эффекты:

Во время курса лечения, наряду с желаемым действием препарата, могут возникнуть побочные эффекты, такие как повышенная реакция на свет.

Побочные эффекты, требующие особого внимания:

При возникновении раздражения, воспаления или высыпания в месте применения (редко) – прекратите лечение и обратитесь к лечащему врачу.

В случае если Вы заметили побочные эффекты, не упомянутые в данной инструкции, или произошло изменение в общем самочувствии - незамедлительно обратитесь к лечащему врачу.

Рекомендуемые дозы при отсутствии иных указаний врача:

При лечении перхоти: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости или в соответствии с предписаниями врача.

При лечении псориаза, себореи или зуда: 2-3 раза в неделю или в соответствии с предписаниями врача.

Данный препарат обычно не предназначен для младенцев.

Внимание:

Данный препарат предназначен исключительно для наружного применения.

Указания к применению:

1. Тщательно смочите волосы водой. Нанесите достаточное количество Альфосил “2 в 1” и вотрите быстрыми движениями в волосы и кожу головы.
2. Тщательно смойте водой и повторите процедуру, массируя кожу головы в течение нескольких минут, до образования густой пены.
3. Тщательно смойте водой.

Избегайте отравления!

Данный препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления.

Если Вы применили избыточную дозу, или ребенок по ошибке проглотил этот препарат - незамедлительно обратитесь в приемный покой больницы, захватив с собой упаковку препарата.

Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача!

Лекарства нельзя принимать в темноте! Проверяйте надпись и дозу каждый раз перед применением препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Хранение:

Хранить в прохладном месте.

Даже при хранении в рекомендуемой упаковке/рекомендуемых условиях препараты имеют ограниченный срок годности. Обратите внимание на срок годности препарата! В случае сомнения – проконсультируйтесь с фармацевтом, выдавшим препарат.

Не храните разные препараты в одной упаковке.

Регистрационный номер препарата: 060 84 27674 22

Производитель:

Purna Pharmaceuticals, Belgium.

Владелец лицензии и импортер:

GlaxoSmithKline (Israel) Ltd.,
25 Basel Street, Petach-Tikva.

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

١٩٨٦ (مستحضرات)

اقرأ/ي النشرة بامكان حتى نهايتها
قبل إستعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتها
فحص ورخص في شهر كانون الأول ٢٠٠٦

الفوسيل™ في ٢

شامبو طبي مع ملين

التركيب:

Alcoholic extract of coal tar 5.0% w/w

المواضيع الفعالة:

Sodium Lauryl Sulphate
Ammonium Lauryl Sulphate
Hexylene Glycolstearate SLS
Lauramide DEA
Herbal Fragrance
Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 2910
Citric Acid Anhydrous
Guar Hydroxy Propyl Trimonium Chloride
Methyl Parahydroxybenzoate
Propyl Parahydroxybenzoate
Patent Blue V Dye
Purified Water

تأثيرات الدواء الطبية:

المعالجة إضطرابات جلد فروة الرأس كالقشرة،
الصدفية، السيلان الدهني التقشيري، تخفيف
الحك والتخلص من القشرة وهي أعراض
تصاحب أحياناً الإكزما.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز لك إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت
لديك حساسية لأحد مركباته.
لا يجوز إستعمال هذا الدواء على جلد ملتهب
بشكل حاد.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة
الطبيب مقدماً:
عندما تكونين في فترة الحمل أو عندما تكونين في
فترة الرضاعة.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك
اليومية؟

قد يسبب هذا الدواء حساسية خاصة عند
تعرضك للشمس؛ لذا تجنب/ي التعرض لها
وإحرص/ي منها وذلك بإتخاذ وسائل الحماية
الكافية (كاللبسة الطويلة، قبعة، مراهم واقية،
الخ).

تحذيرات:
يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام
أو عقاقير، بما في ذلك هذا الدواء، قبل إستعمالك
للهواء.

تجنب/ي تلامس الدواء بالعينين وإن حصل ذلك
خطأ يجب الشطف جيداً بالماء.

التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تتناولين دواء إضافياً أو إذا أنهيت
العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب
المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة
الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية:
إضافة إلى التأثيرات الطيبة المرغوبة للدواء، فقد

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق
بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع،
وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أفرطت في إستعمال المقادير الدوائية أو إذا بلع
الطفل/ة خطأً من هذا الدواء، عليك التوجه إلى
المستشفى حالاً مصطحبًاً بعبوة الدواء.
لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من
الطبيب.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة: يجب تشخيص
طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل
مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضعف/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين:
في مكان بارد.

تبقي الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى
 ولو ظلت في علبها الأصلية وتم حفظها بموجب
تعليمات الحزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء
صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة
الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك
هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٢ ٢٧٦٧٤ ٨٤ ٦٠

تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض
الجانبية كالحساسية للضوء.

الأعراض التي تقتضي إهتماماً خاصاً:
إذا تطور تهيج، إلتهاب أو طفح في مكان العلاج
(نادرًا): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.
أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في
هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك
العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

**المقادير الدوائية الإعتيادية في حالة عدم
وجود تعليمات أخرى من الطبيب:**

معالجة القشرة:

مرة - مرتين أسبوعياً حسب اللزوم أو حسب
تعليمات الطبيب.
٢ - ٣ مرات في الأسبوع أو حسب تعليمات
الطب.

هذا الدواء غير مخصص للإستعمال عادة لدى
الرضع.

إنتبه/ي!

هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

إرشادات الإستعمال:

١ - يرطب الشعر بالماء بشكل أساسى، بعد ذلك
يجب الدهن بكمية وافرة من **الفوسيل**
٢ في ١" ومن ثم تدليك الشعر وجلد فروة
الرأس بحركات سريعة.

٢ - اشطف/ي بالماء جيداً وكرر/ي العمل ثانية،
مع تدليك جلد فروة الرأس خلال عدة دقائق
حتى تشكل رغوة كثيفة.

٣ - اشطف/ي بالماء جيداً.

المنتج:

فورنه - فارماسيوتيكاليس، بلجيكا.

صاحب الإمتياز والمستورد:

چلاكسوس ميثكلайн (إسرائيل) م.ض..

شارع بازل ٢٥، بيتح - تلثا.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות.

שים/י לב :

תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:

1. יש להרטיב את השיער במים בסודיות, לאחר מכן יש למרוח בכמויות נדירות של **אלפוסיל** "2 ב-1" ולעשות בתנועות מהירות את השיער והקרקפת.

2. לשטוף היטב במים ולהזoor על הפעולה השנייה, תוך עיסוי הקrkft במספר מספר דקות עד להויזחתן קצף סמיר.

3. לשטוף היטב במים.

מניעי הרעלתני

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנען הרעלתני.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולמים, והבא/י אריזת התרופה אותה.

אין לגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהינך נטל/ת תרופה.

יש להרכיב משקפיים אם הינך זוקק/ה להם.

אחסנה: במקומות קרים.

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצות, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיטי בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופך שספיק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אrizה.

מס' רישום התרופה: 22 27674 84 060

היצן: פורנה פארמצ'יז'יט'יקלט, בלגיה.

בעל רישום ויבואן:

גלקסוסמית'קלין (ישראל) בע"מ,
רחוב בזל 25, פתח-תקווה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא

לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון או מנינקה.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

תרופה זו עלולה לגרום לריגישות מיוחדת עם חסיפה לשמש; על-כן יש להימנע מחסיפה לשמש ולדאוג להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו').

ażhorot:

אם הינך רגש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, כולל תרופה זו, عليك להודיע על-כך לרופא לפני Nutzung התרופה.

יש להימנע מגע החומר בעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף בעיניים.

תגובהות בין-תרופתיות:

אם הינך מטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת عليك לדוחה לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות המבעים מתגובהות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי:

בנוסף לפיעולות הרצiosa של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון רגישות לאורה.

תופעות המחייבות התיחסות מיוחדת:

אם התפתח גירוי, דלקת או פריחה במקום הטיפול (נדיר): יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשותך הכלליות عليك להתיעץ עם הרופא מיד.

מיןון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מרופא:

טיפול בקשישים:

1-2 פעמים בשבוע לפי הצורך או לפי הוראות רופא.

טיפול בספחת, חלביות גרד:

2-3 פעמים בשבוע או לפי הוראות רופא.

עלון לצורךן לפי תקנות הרווקחים

(תקשיירום) התשמ"ז – 1986

קראוי בעיון את העלון עד סוף

בטרם השתמש/י בתרופה

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר בחודש דצמבר 2006

אלפוסיל™ "2 ב-1"

שמפו רפואי עם מרכך

הרכב: w/w כטוי פעילים:

Sodium Lauryl Sulphate

Ammonium Lauryl Sulphate

Hexylene Glycolstearate SLS

Lauramide DEA

Herbal Fragrance

Hydroxy Propyl Methyl Cellulose 2910

Citric Acid Anhydrous

Guar Hydroxy Propyl Trimonium Chloride

Methyl Parahydroxybenzoate

Propyl Parahydroxybenzoate

Patent Blue V Dye

Purified Water

פעילות רפואיות:
טיפול בהפרעות בעור הקrkft כגון קשחתה,
ספחת (psoriasis), חלביות (seborrhoea), הקלה
בגדוד והסרת קשキים הנלוים לעתים קרובות
לאזומה.

מתי אין להשתמש בתקשיירום?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביו
התרופה.
אין להשתמש על עור המודלק בצורה חריפה.