

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

סטופיט כמוסות

הרכב החומר הפעיל :

כל כמוסה מכילה : Loperamide HCl 2 mg

המרכיבים הבלתי פעילים כוללים :

Lactose, pregelatinized starch, magnesium stearate, dioctyl sodium sulphosuccinate.

פעילות רפואית : מאיט את קצב תנועת המעיים.

התרופה מיועדת לטיפול בשלשול חריף.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתכשיר באם הינך חייב/ת להמנע מעצירות או אם יש חסימה במעיים או מחלה כרונית כלשהי במעיים.
אין להשתמש בתכשיר במידה והינך סובל/ת מדלקת במעי הגס או אם השלשול נגרם מטיפול אנטיביוטי.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה, או אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד, או אם יש חשש שהשלשול נגרם מהרעלת מזון או מחידקים בשתיה, או במקרה של דימום רקטלי או נפיחות חריגה של הבטן, או במידה שהינך סובל/ת מדיזנטריה או מהתייבשות שמתבטאת בסממנים כגון: סחרחורת, ירידה בהטלת שתן, עור מכווץ, צימאון יתר.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין-תרופתיות :

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: נרקוטיקה (אופיואידים כולל קודאין) ואנטיביוטיקה.

תופעות לוואי :

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: יובש בפה, בחילה, סחרחורת.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת :

פריחה בעור או נפיחות חריגה של הבטן (נדיר מאוד) – הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.

עייפות, נמנום, או צימאון מוגבר (נדיר): פנה/י לרופא מיד!
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכל על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

2 כמוסות בהתחלה ולאחר מכן כמוסה אחת לאחר כל יציאה נוזלית. המינון המקובל הינו 3-4 כמוסות ליום. אין ליטול יותר מ-8 כמוסות ליום; אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיעדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 4 שנים. שימוש בתרופה בילדים בגילאים 4-12 שנים חייב מרשם רופא ופקוח רפואי. מינון לילדים בגילאים 4-12 שנים יקבע על ידי הרופא המטפל.
במידה והשילשולים נמשכים יותר מיממה אחת ו/או מתפתח חום, יש לפנות לרופא.

אופן השימוש:

אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבליעתה.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?

יש להרבות בשתייה (של משקאות נטולי קפאין) על מנת למנוע התייבשות מהשלשול. מומלץ לאכול מאכלים קלים לעיכול. רצוי להמנע ממאכלים מטוגנים או מתובלים וכן מאכילת פירות וירקות ומשתיית משקאות חריפים.

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזה התרופה איתך.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום קריר.

גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 676428224

מעבדות רפא בע"מ
ת.ד. 405, ירושלים